




PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Special Book Fund,
1905
Septemb 1897
R W Gibson Invt

PLANTÆ
VASCULARES SEU COTYLEDONEÆ
SCANDINAVIÆ,

NEMPE

SVECIÆ ET NORVEGIÆ,

JUXTA

REGNI VEGETABILIS
SYSTEMA NATURALE

DIGESTÆ

A

P. J. BEURLING.



HOLMIÆ, 1859.
P. A. NORSTEDT & FILII.

MEMORIÆ


BEATI AMICI

JOH. EM. WIKSTROEMII

HÆC OTIA

DICATA

VOLUIT AUCTOR.



PLANTARUM

VASCULARIUM SEU COTYLEDONEARUM

CLASSIS PRIMA,

NEMPE:

EXOGENEÆ SEU DICOTYLEDONEÆ.

ORD. I. RANUNCULACEÆ JUSS.

1. Anemone Linn.

a. Pulsatilla Mill. [1]

1. A. vernalis Linn. [2]
2. A. patens Linn. [2]
(2.) A. Wolfgangiana Bess.
3. A. Pulsatilla Linn. [3]
4. A. pratensis Linn. [2]

b. Euanemone.

5. A. sylvestris Linn.
6. A. nemorosa Linn.
7. A. ranunculoides Linn.

c. Hepatica Linn. [4]

8. A. Hepatica Linn. [5]

2. Adonis Linn.

1. A. vernalis Linn. [6]

3. Myosurus Linn.

1. M. minimus Linn. [7]

4. Ficaria Roth.

1. F. ranunculoides Roth. [8]

5. Ranunculus Linn. [9]

a.? Coptidium.

1. R. lapponicus Linn. [10]

b. Euranunculus. [11]

α. Tomophylli:

* Hecatoniæ:

2. R. hyperboreus Rottb. [12]
3. R. pygmæus Wg.
4. R. sceleratus Linn. [13]

* * Echinellæ:

5. R. arvensis Linn.

* * * Ranunculastra:

6. R. Philonotis Ehrh.
7. R. repens Linn.
»hirsutus».
8. R. bulbosus Linn.
9. R. nemorosus DC. [14]
10. R. polyanthemos Linn.
11. R. auricomus Linn. [15]
12. R. cassubicus Linn.
(13.) R. Steveni Andrz. [16]

---

[1]) Inter *Pulsatillas* et *Euanemones* mediat sect. Preonanthus DC. (Anem. alpina Linn.) — [2]) Pulsatilla Mill. — [3]) Pulsatilla vulgaris Mill. — [4]) (*Hort. Clifort.*) — [5]) Hepatica triloba Chaix. H. nobilis Rchnb. — [6]) E sect.: *Consiligo* DC. — [7]) Ranunculus Myosurus Ad. Afz. — [8]) Ranunculus Ficaria Linn. — [9]) Generis clavis: a. *chrysanthi* (α. tomophylli, β. holophylli); b. *leucanthi* (α. holophylli, β. tomophylli.) — [10]) *Ranunculis* socius invitus, familiarior *Coptidi.* Coptidium ranunculoides Beurl. in herbar. propr. — [11]) »*Solögon*» (Heliophthalmum). — [12]) Ran. hederaceus Linn. herbar. (*specim. island.*) — [13]) *Hecatonia* sensu primitivo (H. palustris), a: ἑκατον, ob multitudinem carpellorum; *annuus* (*Hecatoniæ* ceteræ perennes). — [14]) (*Non* Fr. herbar. norm. XIV. 25 »nemorosus»: Ran. polyanthemos ipsiss.) R. aureus Schleich. exsicc., Rchnb. icon. fig. 4608; »in pratis ad *Martebo* Gottl.» (*Wg.*), unde specim. sat luculent. vidi. — [15]) Quoad folior. *secturam* affinibus variabilior. — [16]) (*Bess.*), Rchnb. icon. fig. 4605.; in subalpestribus hinc inde (prope *domicilia*), nec non ad ruin. »*S:nct Göran*» Visbiæ!; nonnullis: »sylvaticus», item »velutinus». (Ex hort. elaps.: »silvaticus» Fr., herbar. norm. XI. 31, non *alior.* Ran. Friseanus Jord. R. Friesii Gren. et Godr.) —

13. R. acris Linn.
»pumilus».[17]
14. R. (altaicus Laxm.)[18]
(14.) R. sulphureus Soland.
15. R. nivalis Linn.

**** Grumosi:

16. R. illyricus Linn.

β. Holophylli:

17. R. Lingua Linn.
18. R. Flammula Linn.
19. R. reptans Linn.[19]

c. Hecate.

α. (Holophylli.)[20]
β. Tomophylli:

(20.) R. platanifolius Linn.
20. R. (aconitifolius Linn.)
21. R. glacialis Linn.[21]

d. Batrachium DC.[22]

22. R. hederaceus Auct.[23]
23. R. aquatilis Linn.[24]

6. Caltha Linn.

1. C. palustris Linn.

7. Trollius Linn.

1. T. europæus Linn.

8. Aconitum Linn.

a. Lycoctonum DC.

1. A. Lycoctonum Linn.[25]

b. Cammarum DC.

2. A. Stoerkianum Rchnb.[26]

c. Napellus DC.

3. A. napelloides Sw.[27]

9. Delphinium Linn.

1. D. Consolida Linn.[28]

10. Aquilegia Linn.

1. A. vulgaris Linn.

11. Thalictrum Linn.

a. Tripterium DC.

1. T. aquilegifolium Linn.

b. Euthalictrum DC.

2. T. alpinum Linn.
3. T. vulgatum F.W.Schultz.[29]
4. T. Jacquinianum Koch.[30]

---

[17]) (Wg. lapp.); usque in *Magerö*, ubi optimus. — [18]) Subsequenti vegetior; ceterum vix discrepans. — [19]) Ran. Flammula β. Sm. — [20]) In *Scand.* desunt. — [21]) Var. caul. 2—3—floro. — [22]) Batrachium Koch: *sect. Geranii.* — [23]) Vide sub Ran. hyperboreo, haud absimili. Batrachium hederaceum Dum.: in Linn. herbar. non reperiendus. — [24]) Batrachium aquatile Wimm.; distinguuntur (ex DC. aliisq. nil nisi modificationes): Ran. peltatus Schrank (nonnunq. »truncatus»); R. triphyllos Wallr. (Fr. herbar. norm. XI. 32. R. Friesii Beurl. in bot. not. 1852 pag. 156); R. confusus Gren. et Godr. (Fr. l. c. X. 28 »Petiveri». R. Kochii Beurl. l. c.); R. cæspitosus Thuill. (Fr. l. c. XI. 33); R. paucistamineus Tausch (Fr. l. c. IX. 27); R. confervoides Fr. bot. utfl. ed. II. pag. 278 (R. aquatilis eradicatus Læst. in sched. R. paucistamineus borealis Beurl. l. c.); R. divaricatus Schrank (R. circinatus Sibth., nom. recent.); R. Rionii Lagg. (hujus stirpis et subsequentis specim. *scand.* non vidi); R. Drouetii Gren. et Godr.; R. marinus Hartm. scand. ed. IV. (conf. R. Baudotii Godr.); R. fluitans Oed. fl. dan. tab. 376 (normalis, pentapetalus, qualem in *Norr-ström* Holmiæ legi; pleiopetalus, »carpellis abortivis» *Rchnb.*: R. fluitans Lam.). — [25]) (*Svec.* et *herbar.*) Acon. septentrionale Koell. — [26]) Acon. Napellus Linn. herbar. »A. Cammarum Linn. spec. ex sententia Cl. Friesii, sed nec loci natales nec synonyma congruunt» *Koch.* — [27]) Acon. Napellus Linn. svec. quoad loc. nat. A. neubergense Rchnb.; in Linn. herbar. frustra quæsitum. — [28]) E sect.: *Consolida* DC. — [29]) Thal. minus vulgo. T. montanum Wallr. (nom. vix quadrans); *litorale austr.-occidentale* habitans, in Linn. herbar. haud reperiendum. — [30]) Thal. minus Linn. herbar., Jacq. T. collinum Wallr. (T.

(4.) T. saxatile DC. [31])
5. T. elatum Murr. [32])
6. T. flavum Linn.
7. T. (strictum Ledeb.)
(7.) T. Friesii Rupr. [33])
8. T. simplex Linn.
»tenuifolium». [34])
9. T. angustifolium Jacq.

12. Actæa Linn.

1. A. spicata Linn.

ORD. 2. BERBERIDEÆ VENT.

1. Berberis Linn.

1. B. vulgaris Linn.

ORD. 3. NYMPHÆACEÆ DC.

1. Nymphæa Linn.

1. N. alba Linn. [35])
(1.) N. biradiata Sommer.

2. Nuphar Sibth. et Sm.

1. N. luteum S. et S. [36])
(1.) N. pumilum Sm.

ORD. 4. PAPAVERACEÆ DC.

1. Papaver Linn.

α. Scapiflora:

1. P. (nudicaule Linn.)
(1.) P. radicatum Rottb.

β. Papaverastra:

2. P. Argemone Linn.
»psilocarpum».
3. P. dubium Linn.
4. P. Rhoeas Linn.
†5. P. somniferum Linn.

2. Glaucium Scop.

1. G. luteum Scop.

3. Chelidonium Linn.

1. C. majus Linn.
»crenatum».

ORD. 5. FUMARIACEÆ DC.

1. Fumaria Linn.

†1. F. capreolata Linn.
†2. F. agraria Lag. [37])
3. F. officinalis Linn.
(3.) F. tenuiflora Fr. [38])
4. F. Vaillantii Lois.

2. Corydalis DC. [39])

α. Solidæ:

1. C. fabacea Pers. [40])
(1.) C. pumila Rchnb.
(1.) C. laxa Fr. [41])
2. C. bulbosa DC.

β. Cavæ:

3. C. tuberosa DC.

Kochii Fr.); in *Gottl.*, unde T. minus suum habuit *Linné.* — [31]) Thal. flexuosum Rchnb; vidi specim. e coemeter. paroec. *St. Ibb* Scan. — [32]) Rchnb. icon. fig. 4633 (*ipsiss.!*) Thal. majus Wg. svec., Beurl. in bot. not. 1853 p. 55. T. kemense Fr. — [33]) Thal. strictum boreale Nyl. T. rariflorum Fr. — [34]) *Oeland.!* — [35]) Castalia speciosa Salisb. — [36]) De modificationib. vide Læst. in bot. not. 1858 pag. 137—143. — [37]) Fumar. media DC., et forte *Lois.*, negantibus iis, qui F. officinalem *α.* pro F. media Lois. et F. officinalem *β.* pro F. officinali Lois. habent. — [38]) Fumar. officinalis *β.* Koch. — [39]) *Nostræ* e sect.: *Bulbocapnos* Bernh. — [40]) Bract. una alterave nonnumq. *incisa.* — [41]) Bract. una al-

ORD. 6. RESEDACEÆ DC.

1. Reseda Linn.

1. R. Luteola Linn. [42])

ORD. 7. CRUCIFERÆ JUSS.

A. *SILIQUOSÆ Linn.* [43])

1. Arabis Linn.

a. Turritis Linn.

1. A. perfoliata Lam. [44])

b. Turritina Rchnb.

(2.) A. sagittata DC. [45])
(2.) A. Gerardi Juss. [46])
2. A. hirsuta Scop.
»alpestris». [47])
3. A. (ciliata R. Br.)
Retziana. [48])

c. Thaliana.

4. A. Thaliana Linn. [49])
»lyrata». [50])
5. A. (arenosa Scop.)
»macilenta». [51])
6. A. petræa Lam.
»hispida». [52])

d. Euarabis.

7. A. alpina Linn.

2. Braya Sternb. et Hopp.

1. B. alpina S. et H.

3. Nasturtium R. Br.

a. Erucina.

1. N. supinum. [53])

b. Eunasturtium.

(2.) N. siifolium Rchnb.
2. N. officinale R. Br.
(2.) N. microphyllum Boenningh.

4. Cardamine Linn.

α. Annuæ:

* Exauriculatæ:

1. C. bellidifolia Linn.
(2.) C. sylvatica Link.
»clandestina». [54])
2. C. hirsuta Linn.
3. C. parviflora Linn.

** Auriculatæ:

4. C. impatiens Linn.

β. Perennes:

(5.) C. dentata Schult.
5. C. pratensis Linn.
»plena». [55])
6. C. amara Linn.
(6.) C. umbrosa Lej. [56])
»trisecta». [57])
»integrifolia». [58])

5. Dentaria Linn.

1. D. bulbifera Linn.

6. Alliaria Scop.

1. A. officinalis DC.

---

terave nonnumq. *integra.* — [42]) E sect.: *Luteola* DC. — [43]) *Arabideæ, Sisymbrieæ, Brassiceæ.* — [44]) Turritis glabra Linn. — [45]) Turritis Bertol. — [46]) Turritis Bess. — [47]) Turritis Schleich.; legi in *Totthummeln* alpis *Åreskutan.* — [48]) Turritis alpina Linn. herbar., Retz.! Arab. hirsuta δ. Wg. svec. — [49]) Sisymbrium Thalianum Gaud. — [50]) Sisymbrium Thalianum β. Koch. — [51]) Arab. svecica Fr. — [52]) Huc ducitur Arab. hispida Linn. fil. suppl. — [53]) Sisymbrium Linn. Braya supina Koch. — [54]) Fr. herbar. norm. VII. 18. Cardam. umbrosa Andrz., non *Lej.* — [55]) In fundo *calcareo.* — [56]) Cardam. amara hirta Wimm. et Grab. — [57]) Cardam. trifolia Linn. svec. — [58]) Foliol. in folium integrum confluentibus.

7. Hesperis Linn.

†1. H. matronalis Linn.

8. Erysimum Linn.

1. E. cheiranthoides Linn.
2. E. hieracifolium Linn.
   »alpinum». [59])
   »simplex».

9. Barbarea R. Br.

1. B. vulgaris R. Br.
(1.) B. arcuata Rchnb. [60])
2. B. taurica DC. [61])
3. B. iberica DC. [62])

10. Sisymbrium Linn.

a.? Velarum DC. [63])

1. S. officinale Scop. [64])

b. Eusisymbrium.

α. Iriones:

2. S. Loeselii Linn.
3. S. Irio Linn.

β. Descureæ:

4. S. Sophia Linn.

11. Roripa Scop. [65])

1. R. sylvestris Rchnb.
2. R. anceps Rchnb.
3. R. palustris Rchnb.
4. R. amphibia Rchnb.

12. Erucastrum DC.

†1. E. Pollichii Spenn.

13. Diplotaxis DC.

†1. D. muralis DC.
†2. D. tenuifolia DC.

14. Brassica Linn.

1. B. Rapa Linn.:
   »oleifera». [66])
   »sylvestris». [67])
   † »rapifera». [68])
2. B. Napus Linn.:
   »oleifera». [69])
   »sylvestris». [70])
   † »napifera». [71])

15. Sinapis Linn.

a. Melanosinapis DC. [72])

1. S. nigra Linn. [73])

b. Eusinapis.

2. S. arvensis Linn.
(2.) S. Schkuhriana Rchnb. [74])

c. Leucosinapis DC.

3. S. alba Linn.

B. *LOMENTACEÆ DC.* [75])

16. Raphanus Linn.

a. Raphanistrum Gærtn.

1. R. Raphanistrum Linn. [76])

b. Euraphanus.

†2. R. sativus Linn.

— [59]) Cheiranthus alpinus Linn. herbar., Wg. lapp., DC.; siliquæ *subabbreviatæ;* legi in *Totthummeln* alpis *Åreskutan.* — [60]) (*Sturm.*) — [61]) Barb. arcuata Rchnb. in bot. ztng. B. præcox Fr., non *R. Br.* — [62]) Cheiranthus ibiricus Willd. enum., ubi verba: »fol. caulinis ovatis obtusis angulato-subdentatis». Barb. parviflora Fr. — [63]) Chamæplium Wallr. (nom. recent.). — [64]) Erysimum Linn. Velarum Beurl. in herbar. propr. Chamæplium Wallr. — [65]) *Nasturtii* spec. Auct. — [66]) Brass. campestris Linn.; *annua, segetalis.* — [67]) Fr. herbar. norm. X. 31; *biennis* — [68]) Brass. Rapa Linn.; *biennis.* — [69]) Brass. præcox Waldst. et Kit.; *annua, segetalis.* — [70]) Brass. Napus Linn.; *biennis.* — [71]) Brass. Napus esculenta Auct.; *biennis.* — [72]) *Eusinapis* re vera (non sensu botanicor.). — [73]) Melanosinapis communis Spenn. — [74]) Siliqu. *retrorso-hispidæ.* — [75]) *Raphaneæ, Cakilineæ.* — [76]) Ra-

17. Cakile Scop.

1. C. maritima Scop.
(1.) C. latifolia Poir.

18. Crambe Linn.

1. C. maritima Linn.

C. *NUCAMENTACEÆ DC.* [77])

19. Bunias Linn.

1. B. orientalis Linn.

20. Neslia Desv.

1. N. paniculata Desv.

21. Camelina Crantz.

(1.) C. microcarpa Andrz. [78])
1. C. sylvestris Wallr. [79])
2. C. sativa Auct. [80])
(2.) C. dentata Pers.

22. Isatis Linn.

1. I. tinctoria Linn.

D. *SILICULOSÆ Linn.* [81])

23. Capsella Vent.

1. C. Bursa pastoris Moench. »sublyrata».

24. Thlaspi Linn.

1. T. alpestre Linn.
2. T. perfoliatum Linn.
3. T. arvense Linn.

25. Teesdalia R. Br.

1. T. Iberis DC. [82])

26. Hutchinsia R. Br.

1. H. petræa R. Br. [83])

27. Senebiera Poir. [84])

a. Nasturtiolum Medik.

1. S. didyma Pers.

b. Eusenebiera.

2. S. Coronopus Poir.

28. Lepidium Linn.

a. Cardamon DC.

† 1. L. sativum Linn.

b. Senkenbergia Fl. wett.

2. L. ruderale Linn. [85])

c. Lepia Desv.

3. L. campestre R. Br. [86])

d. Eulepidium.

4. L. latifolium Linn.

e. Cardaria Desv.

5. L. Draba Linn. [87])

29. Cochlearia Linn.

a. Armoracia Fl. wett.

1. C. Armoracia Linn. [88])

b. Eucochlearia.

2. C. officinalis Linn.
3. C. anglica Linn. [89])
(3.) C. Wahlenbergii Rupr. [90])
4. C. arctica Schlecht. [91])
5. C. danica Linn.

---

phanistrum segetum Baumg. — [77]) *Buniadeæ, Camelineæ, Isatideæ.* — [78]) (*DC.*) — [79]) Camel. sativa pilosa DC. — [80]) Crantz pr. p:te; »glabrata», »foetida», *sativa!* — [81]) *Thlaspideæ, Lepidineæ, Alyssineæ.* — [82]) Teesd. *nudicaulis* R. Br. *Nb.* Iberis *nudicaulis* Linn.: Teesd. Iberis DC.; Lepidium *nudicaule* Linn.: Teesd. Lepidium DC. — [83]) *Hornungia* Rchnb. — [84]) Coronopus Hall. (non *Tournef.*: Plantago Coronopus). — [85]) Senkenbergia ruderalis Fl. wett. — [86]) Lepia campestris Desv. — [87]) (*Spec. ed. I.*) Cochlearia Linn. spec. ed. II. Cardaria Desv. Cardiolepis dentata Wallr. — [88]) Armoracia rusticana Fl. wett. — [89]) Dubia civis; »grandiflora». — [90]) Cochl. anglica Wg. lapp.; »parviflora». — [91]) (*DC.*);

30. Lunaria Linn.

1. L. rediviva Linn.

31. Alyssum Linn.

1. A. calycinum Linn. [92])

32. Farsetia R. Br.

1. F. incana R. Br. [93])

33. Draba Linn.

a. Eudraba.

1. D. incana Linn. [94])
2. D. hirta Linn. [95])
3. D. lactea Adams. [96])
4. D. carinthiaca Hopp. [97])
5. D. nivalis Liljebl. [98])
6. D. alpina Linn.
(6.) D. oxycarpa Sommerf.

b. Drabella DC.

7. D. nemorosa Linn. [99])
8. D. muralis Linn.

c. Erophila DC.

9. D. verna Linn. [100])
(9.) D. præcox Stev.

34. Subularia Linn.

1. S. aquatica Linn.

ORD. 8. CARYOPHYLLEÆ JUSS.

A. *ALSINEÆ DC.*

SPERGULEÆ: [1])

1. Sagina Linn. [2])

a. Eusagina. [3])

1. S. maritima G. Don. [4])
(1.) S. stricta Fr.
2. S. (apetala Auct.) [5])
(2.) S. ciliata Fr. [6])
3. S. procumbens Auct. [7])

b. Saginoides. [8])

4. S. subulata Presl. [9])
5. S. saxatilis Wimm. [10])
(5.) S. nivalis Fr. [11])

2. Spergella Rchnb. [12])

1. S. nodosa Rchnb.
»glandulosa».

3. Spergula Linn.

1. S. pentandra Linn.
(1.) S. Morisonii Boreau.
2. S. arvensis Linn.
(2.) S. sativa Boenningh. [13])
(2.) S. maxima Weih. [14])

4. Spergularia Pers.

1. S. rubra Pers. [15])
2. S. salina Presl. [16])

---

habeo specim. e *Fagernäs* Finnmark. — [92]) *Psilonema* C. A. Mey. — [93]) *Berteroa* DC. Draba cheirifolia Berg. — [94]) Leiocarpa: Drab. contorta Ehrh.; hebecarpa: D. confusa Ehrh. — [95]) Huc: Drab. incano-hirta Hartm. (D. dovrensis Fr.); D. laxa Lindbl.; D. rupestris R. Br.; D. scandinavica Lindbl.; D. lutescens Hartm., et forte D. trichella Fr. — [96]) (*1817.*) Drab. Wahlenbergii Hartm. (1820). — [97]) Drab. curtisiliqua (D. brachycarpa) J. E. Zetterst. — [98]) In *subalpinis* haud parum *major* (forma jam a *Lindbl.* indicata, *ipsi* dubia!) — [99]) Leiocarpa: Drab. lutea Gilib.; hebecarpa: D. nemoralis Ehrh.; infauste D. *nemorosa* in *muris,* in *nemorosis* D. *muralis.* — [100]) Erophila vulgaris DC. — [1]) *Stipulatæ* (Spergulæ et Spergulariæ) a nonnullis ex *Ordine* dimittuntur. — [2]) *Saginarum* flores sæpe 4- et 5-meri ex *eadem* radice. — [3]) Flores *potiss.* 4-meri. — [4]) (*Engl. bot. XXXI. tab. 2195); ex.* gr. in arenosis maritimis infra *Stenshufvud* Scan. — [5]) Vide sub. Sagin. procumb.; in Linn. herbar. deest. — [6]) Sagin. apetala Wg. svec. — [7]) Sagin. apetala Linn. herbar.; vide sub S. subulata. — [8]) Flores *potiss.* 5-meri. — [9]) Sagin. procumbens et Spergula saginoides Linn. herbar. — [10]) Spergula saginoides Sw.; in Linn. herbar. non reperienda. — [11]) Spergula Lindbl.! — [12]) (Specieb. excl.). — [13]) *Segetalis.* — [14]) *Linicola.* — [15]) Arenaria Linn. — [16]) Fr.

»marina». [17]
3. S. media Pers. [18]

STELLARIEÆ:

5. Holosteum Linn.

1. H. umbellatum Linn.

6. Cerastium Linn.

a. Esmarchia Rchnb.

1. C. tetrandrum Curt. [19]

b. Eucerastium.

2. C. semidecandrum Linn.
(2.) C. macilentum Aspegr.
3. C. alsinoides Pers. [20]
(3.) C. obscurum Chaub. [21]
(3.) C. litigiosum Lois. [22]
4. C. viscosum Auct. [23]
5. C. brachypetalum Desp. [24]
6. C. vulgatum Auct. [25]
»alpinum». [26]
(6.) C. holosteoides Fr.
7. C. arvense Linn.
(8.) C. glabratum Hn. [27]
8. C. alpinum Linn. [28]
(8.) C. lanatum Lam.
9. C. latifolium Linn. [29]

c. Malachium Fr. [30]

10. C. aquaticum Linn. [31]

7. Stellaria Linn.

a. Alsine Linn.

1. S. media Cyr. [32]
(1.) S. neglecta Weih.

b. Eustellaria.

α. Alsinoideæ:

2. S. nemorum Linn.

β. Holosteæ:

3. S. Holostea Linn.

γ. Stellariastra:

4. S. glauca With. [33]
5. S. graminea Linn.
6. S. Friesiana Ser. [34]
(6.) S. alpestris Fr. [35]

δ. Larbreæ: [36]

7. S. borealis Big. [37]
8. S. uliginosa Murr. [38]
9. S. crassifolia Ehrh. [39]
(9.) S. elodes MB. [40]
(9.) S. brevifolia Schum. [41]

ε. Dichodontes: [42]

10. S. humifusa Rottb.
11. S. cerastoides Linn. [43]

---

herbar. norm. VIII. 37! — [17]) Arenaria rubra marina Linn. A. marina Roth, Sm. etc. — [18]) Arenaria Linn. A. marginata DC. — [19]) Esmarchia cerastoides Rchnb. — [20]) Cerast. glutinosum Fr., Rchnb. icon. fig. 4968 dextr.! C. glutinosum pallens Koch; *pallide virens.* — [21]) Fr. herbar. norm. IV. 54 »glutinosum», Rchnb. icon. fig. 4969 dextr. »viscarium». Cerast. glutinosum obscurum Koch. — [22]) Cerast. atrovirens Bab., Rchub. icon. fig. 4969 sinistr. — [23]) *Curt.* Cerast. vulgatum Linn. C. glomeratum Thuill. — [24]) (*Pers.*) Cerast. strigosum Fr. — [25]) *Curt.* Cerast. viscosum Linn. C. vulgare Hartm. C. triviale Link. — [26]) (Sturm). — [27]) Cerast. alpinum Linn. herbar. — [28]) *Auct.* — [29]) *Nb.* Sunt, qui *nostrum* ad præcedens referunt. — [30]) Larbrea Ser. (DC. prodr. I.), non *St. Hil.* — [31]) Malachium Fr. — [32]) Alsine Linn., Lam., DC. etc. — [33]) Stell. palustris Retz. (nom. recent.). — [34]) Stell. longifolia Mühlenb. (*Willd. enum. pag. 479, in not.*) ex Fenzl, Koch dehortante! — [35]) (*Mant. III.*). — [36]) Larbrea St. Hil. — [37]) Stell. alpestris Fr. mant. I. Larbrea uliginosa apetala Rchnb. — [38]) Larbrea Rchnb. — [39]) »In nassen Wiesen — — — fol. ovato-lanceolatis — — — mehr aufrecht» *Ehrh.* Larbrea Rchnb., icon. fig. 3667! Stell. uliginosa paludosa Læst. — [40]) Rchnb. icon. fig. 4909 b. et 4911 *β.*; in *Dovre* Norveg. — [41]) (*Sælland.*); in litorib. maris imprim. *occidentalis.* — [42]) Dichodon Bartl. — [43]) Dichodon Rchnb. —

ARENARIEÆ:

8. Ammadenia Gmel.

1. A. peploides Gmel. »oblongifolia». [44])

9. Arenaria Linn.

a. Moehringium.

1. A. lateriflora Linn. [45])
2. A. trinervia Linn. [46])

b. Euarenaria.

3. A. serpyllifolia Linn.
(3.) A. viscida Lois.
(4.) A. gothica Fr.
4. A. (ciliata Linn.)
(4.) A. norvegica Gunn.
(4.) A. humifusa Wg.

c. Tryphane Rchnb.

5. A. (verna Linn.) [47])
(5.) A. hirta Wormskj.
(5.) A. rubella Hook.

d. Alsinanthe Rchnb.

6. A. scandinavica Spreng. [48])
7. A. uliginosa Schleich. [49])

e. Sabulina Rchnb.

8. A. (tenuifolia Linn.) [50])
(8.) A. viscosa Pers. [50])

B. *SILENEÆ DC.*

10. Gypsophila Linn.

1. G. muralis Linn.
(1.) G. serotina Hayn.
2. G. fastigiata Linn.
(2.) G. arenaria Waldst. et Kit.

11. Dianthus Linn.

a. Kohlrauschia Kunth.

1. D. prolifer Linn. [51])

b. Eudianthus.

α. Armerioidei:

2. D. Armeria Linn.

β Deltoidei:

3. D. deltoides Linn.
(3.) D. glaucus Linn.

γ. Plumarii:

4. D. arenarius Linn.
5. D. superbus Linn.

12. Saponaria Linn.

† 1. S. officinalis Linn.

13. Silene Linn.

α. Behenanthæ:

1. S. inflata Sm.
(1.) S. uniflora Roth. [52])
2. S. maritima With.

β. Pumiliastra:

3. S. acaulis Linn.

γ. Rupifragæ:

4. S. rupestris Linn.

δ. Atocineæ:

5. S. Armeria Linn.

ε. Stachymorphæ:

6. S. (gallica Linn.)
†(6.) S. quinquevulnera Linn.
(6.) S. anglica Linn.

ς. Siphonomorphæ:

7. S. nutans Linn.
(7.) S. infracta Waldst. et Kit.

---

[44]) Honckenya Torr. et Gray. (Ammad. peploides Gmel.!); *arctica.* — [45]) Moehringia Fenzl. — [46]) Moehringia Clairv. — [47]) Tryphane Rchnb. — [48]) Aren. sphagnoides Thom. catalog. Alsinanthe biflora Rchnb. — [49]) DC., Gaud. Alsinanthe stricta Rchnb. — [50]) Sabulina Rchnb. — [51]) Kohlrauschia prolifera Rchnb. — [52]) Fr.

η. Otitoideæ:

8. S. viscosa Pers.

ϑ. Elisanthæ:

9. S. noctiflora Linn.

14. Wahlbergia [53]) Fr.

1. W. apetala Fr.
2. W. angustiflora Rupr. [54])

15. Melandrium Roehl.

1. M. pratense Roehl.
2. M. sylvestre Roehl.

16. Viscaria Roehl.

1. V. vulgaris Roehl.
2. V. alpina Roehl.
   »alpestris». [55])
   »subacaulis».

17. Lychnis Linn.

1. L. Flos cuculi Linn. [56])

18. Agrostemma Linn.

1. A. Githago Linn. [57])

ORD. 9. LINEÆ DC.

1. Linum Linn.

a. Eulinum.

†1. L. usitatissimum Linn.

b. Cathartolinum Rchnb.

2. L. catharticum Linn. [58])

2. Radiola J. F. Gmel.

1. R. linoides J. F. Gmel.

ORD. 10. HYPERICINEÆ DC.

1. Hypericum Linn.

α. Adenosepala:

1. H. pulchrum Linn.
2. H. montanum Linn.
3. H. hirsutum Linn.

β. Hypericastra:

4. H. quadrangulare Sm. [59])
5. H. quadrangulum Svec. [60])
6. H. perforatum Linn.
7. H. humifusum Linn.

ORD. 11. CISTINEÆ DUN.

1. Helianthemum Mill.

a. Fumana.

1. H. Fumana Mill. [61])

b. Rhodax.

2. H. oelandicum Sw. [62])
(2.) H. canum Dun. [63])

c. Euhelianthemum Dun.

3. H. vulgare Gærtn.
   »petræum». [64])
(3.) H. obscurum Pers. [65])

ORD. 12. DROSERACEÆ DC.

A. *DROSEREÆ Rchnb.*

1. Drosera Linn.

1. D. longifolia Hayn. [66])
(1.) D. obovata Mert. et Koch.

---

herbar. norm. IV. 51 »petræa». — [53]) Emendate, pro: »Wahlbergella». — [54]) Lychnis Dorotheæ Læst. in sched.! *Nb.* L. affinis J. Vahl: Wahlb. Vahlii Rupr. — [55]) Gracilior, sæpe *multicaulis.* — [56]) E sect.: *Coccyganthe* Al. Braun. — [57]) Githago segetum Desf. — [58]) Cathartolinum pratense Rchnb. — [59]) Willd. »et fere omnium Auctorum» *Koch.* Hyper. quadrangulum Linn. pr. p:te, DC. H. acutum Moench. H. tetrapterum Fr. — [60]) Linn. pr. p:te *β.* DC. Hyper. dubium Leers, Sm., Willd. etc. H. obtusum Moench. H. tetragonum Fr. — [61]) Fumana vulgaris Spach. — [62]) *(Sv. bot. tab. 499).* — [63]) Rchnb. icon. fig. 4534. — [64]) *Ocland.!* — [65]) Rchnb. icon. fig. 4548. — [66]) Linn. pr. p:te. —

2. D. intermedia Hayn. [67])
3. D. rotundifolia Linn. [68])

B. *PARNASSIEÆ Rchnb.*

2. Parnassia Linn.

1. P. palustris Linn.
(1.) P. tenuis Wg. [69])

ORD. 13. POLYGALEÆ JUSS.

1. Polygala Linn.

1. P. vulgaris Auct. [70])
(1.) P. oxyptera Rchnb.
2. P. comosa Schkuhr. [71])
3. P. (austriaca Crantz.)
(3.) P. uliginosa Rchnb.

ORD 14. VIOLARIEÆ DC.

1. Viola Linn.

a. Chrysion.

1. V. biflora Linn.

b. Euviola.

α. Uliginosæ:

2. V. palustris Linn. [72])
(2.) V. svecica Fr. [73])
(2.) V. epipsila Ledeb. [74])
3. V. uliginosa Schrad.

β. Violastra:

4. V. borealis J. A. Weinm. [75])
5. V. hirta Linn.
6. V. odorata Linn.

γ. Mirabiles:

7. V. mirabilis Linn.

δ. Caninæ:

(8.) V. Riviniana Rchnb.
8. V. sylvestris Lam. [76])
9. V. arenaria DC.
(10.) V. ericetorum Schrad.
10. V. canina Linn.
»frustranea». [77])
(10.) V. nemoralis Kütz. [78])
11. V. Wahlenbergii. [79])

ε. Stagninæ:

12. V. stagnina Kit. [80])
13. V. pumila Vill. [81])
14. V. persicifolia Schreb. [82])
»pubescens». [83])

c. Mnemion.

15. V. tricolor Linn.
(15.) V. arvensis Murr.

---

[67]) Dros. longifolia Linn. pr. p:te. — [68]) Var. (cum præcedente) florib. ramoso-racemulosis. — [69]) (*Lapp. n:ro 137*). — [70]) Linn. pr. p:te. (vide sub Polygal. comosa); var. in *ericetis* »depressa» quidem, at P. depressæ Wender. specim. *scand.* non vidi. — [71]) Polygal. vulgaris Linn. herbar. — [72]) *Auct.* — [73]) Viol. palustris Linn. herbar. — [74]) Viol. fennica Nyl. V. scanica Fr. — [75]) (*Linnæa X. pag. 66.*) Viol. hirta *β?* umbrosa Wg. V. umbrosa Fr., non *Hopp.*, nec *Saut. in bot. ztng. 1822.* — [76]) Viol. silvatica Fr. »Nomen — — — undique receptum mutare nolui» *Koch.* — [77]) (Læst. in act. holm.); »valde elongat., florib. apetalis non fructificantibus» *Wg.;* usque ad *Strömstad!* Bahus. descendens. — [78]) Rchnb. icon. fig. 4505 sinistr. »Ruppii». Viol. stricta Fr., non *Hornem.* — [79]) Viol. montana Wg. (non *Linn.*, nisi quout nostram ab ipso olim juvene in montanis Lapponiæ visam voluerit intellectam, descriptione posterius facta ad specim. subsequentis, haud absimilis), Fr. herbar. norm. X. 36; in Linn. herbar. non reperienda. — [80]) Viol. montana Linn. spec., svec. et herbar., nomine specifico et loc. natal.: »Lappon.» fallacibus. V. montana lactea Ging. (»V. persicæfolia. *Schreb.!* 1791.» *Fr. summ.!*) — [81]) Rchnb. icon. fig. 4507 »pratensis». — [82]) (*Spicileg. fl. lips., 1771*), Schkuhr, Auct. Viol. stricta Hornem. (*Norvegiæ* ex ips.) V. montana stricta Ging.; tota glabra, a me non nisi in herbar. reg. acad. scient. holm. visa. — [83]) Viol. montana pubescens Ging. V. elatior Fr. *Nb.* Crescit *Lipsiæ*

ORD. 15. BALSAMINEÆ A. RICH.

1. Impatiens Linn.

1. I. noli tangere Linn.

ORD. 16. OXALIDEÆ DC.

1. Oxalis Linn.

α. Corniculatæ DC.

†1. O. stricta Linn.
†2. O. corniculata Linn.

β. Acetosellæ DC.

3. O. Acetosella Linn.

ORD. 17. GERANIACEÆ DC.

1. Geranium Linn.

α. Geraniastra:

* Perennia:

1. G. sanguineum Linn.
2. G. sylvaticum Linn.
3. G. pratense Linn.
4. G. palustre Linn.
†5. G. macrorhizum Linn.
6. G. phæum Linn.

** Annua:

7. G. bohemicum Linn.

β. Columbina:

8. G. columbinum Linn.
9. G. dissectum Linn.
10. G. rotundifolium Linn. [84])
11. G. pusillum Linn.
12. G. molle Linn.
(13.) G. umbrosum Waldst. et Kit.
13. G. pyrenaicum Linn.

γ. Robertiana:

14. G. lucidum Linn.
15. G. Robertianum Linn.

2. Erodium L'Herit.

†1. E. moschatum Ait.
2. E. cicutarium L'Herit.

ORD. 18. MALVACEÆ R. BR.

1. Malva Linn.

a. Eumalva.

1. M. borealis Wallm. [85])
2. M. vulgaris Fr. [86])
3. M. sylvestris Linn.

b. Bismalva Medik.

4. M. moschata Linn. [87])
5. M. Alcæa Linn. [87])
†(5.) M. fastigiata Cav.

2. Lavatera Linn.

1. L. thuringiaca Linn. [88])

ORD. 19. TILIACEÆ JUSS.

1. Tilia Linn.

1. T. parvifolia Ehrh. [89])
(1.) T. vulgaris Hayn. [90])
2. T. platyphylla Scop. [91])

ORD. 20. ACERINEÆ DC.

1. Acer Linn.

1. A. platanoides Linn.
2. A. (campestre Linn.) [92])

---

versus *Funkenburg*, ubi suam olim *Ruppius* legit, ex Koch. — [84]) »Idem in spec. pl. Geran. rotundifolium et G. pusillum optime distinxit, *rotundifolio* petala integra obtusa incarnata, *pusillo* petala bifida cærulea tribuens» *Koch.* G. viscidulum Fr. — [85]) Malv. rotundifolia Linn. pr. p:te *β.* DC. M. pusilla With. (infauste). — [86]) Malv. rotundifolia Linn. pr. p:te, DC. etc. — [87]) Bismalva Medik. — [88]) E sect.: *Olbia* Medik. — [89]) Til. ulmifolia Scop. (nom. peccans). T. sylvestris Desf. — [90]) »Continuatæ observationes me docuerunt hanc esse meram præcedentis varietatem» *Koch.* — [91]) Til. grandifolia Ehrh. — [92]) *α.*: *leiocar-*

(2.) A. hebecarpum Tausch.
†3. A. Pseudoplatanus Linn.

ORD. 21. HIPPOCASTANEÆ DC.

1. Æsculus Linn.

†1. A. Hippocastanum Linn.

ORD. 22. LEGUMINOSÆ JUSS.

A. *LOTEÆ DC.*

GENISTEÆ:

1. Spartium Linn.

1. S. scoparium Linn. [93])

2. Genista Linn.

α. *Inermes:*

* Fasciculatæ:

1. G. pilosa Linn.

** Racemosæ:

2. G. tinctoria Linn.

β. *Spinosæ:*

3. G. germanica Linn.
†4. G. anglica Linn.

3. Ulex Linn.

†1. U. europæus Linn.

4. Ononis Linn.

1. O. spinosa Linn. [94])
2. O. repens Linn. [95])
(3.) O. Retziana. [96])
3. O. arvensis Linn. [97])

5. Anthyllis Linn.

(1) A. maritima Schweigg. [98])
1. A. Vulneraria Linn. [99])
(1.) A. alpestris Hegetschw. [100])

TRIFOLIEÆ:

6. Trifolium Linn.

α. *Lagopoidea:*

1. T. arvense Linn.

β. *Eutrifolia:*

* Phleoidea:

2. T. striatum Linn.

** Trifoliastra:

3. T. alpestre Linn.
4. T. medium Linn.
5. T. pratense Linn.
† »sativum».

γ. *Fragastra:* [1])

6. T. fragiferum Linn.

δ. *Triphyllastra:*

* Decumbentia: [2])

7. T. repens Linn. [3])
8. T. hybridum Linn. [4])

** Erecta:

9. T. montanum Linn.

ε. *Chronosemata:* [5])

10. T. spadiceum Linn.
11. T. agrarium Linn.
(12.) T. campestre Schreb. [6])
12. T. procumbens Linn. [7])
13. T. minus Sm. [8])

---

pum. — [93]) *Sorothamnus* vulgaris Wimm. S. scoparius Koch. — [94]) (*Herbar.*) Onon. campestris Koch et Ziz. — [95]) Onon. procurrens Wallr., Fr. herbar. norm. X. 46. (β. DC., quæ: O. repens Linn. herbar., in arenosis *Europ. australis* provenit.) — [96]) Onon. arvensis Retz, Fr. herbar. norm. X. 45; *decumbens, a nonnullis cum præcedente confusa.* — [97]) (*Syst. nat. et herbar.*) Onon. hircina Jacq. — [98]) Legi in *Sandbugten* ad *Myren* prope *Strömstad* Bahus. — [99]) Modificationes quoad colorem: »ochroleuca» et »coccinea». — [100]) Legi in *Totthummeln* alpis *Åreskutan.* — [1]) Galearia Presl. — [2]) Amoria Presl. — [3]) *Luxur.* petiol. plurifoliolatis — [4]) (*Svec.* et *herbar.*) — [5]) Amarenus Presl. — [6]) Trif. procumbens α. majus Koch. T. agrarium C. C. Gmel. — [7]) Schreb., Fr. herbar. norm. IX. 53. Trif. procumbens β. minus Koch. — [8]) Trif. filiforme Auct. plur., at T.

7. Melilotus Juss.

1. M. macrorhiza Pers. [9]
2. M. officinalis Desr. [10]
(2.) M. Petitpierreana Hayn.
3. M. alba Desr. [11]
4. M. dentata Pers.

8. Trigonella Linn.

†1. T. cærulea Ser. [12]

9. Medicago Linn.

a. Eumedicago.

1. M. falcata Linn.
»versicolor».
»semiannularis». [13]
†2. M. sativa Linn.
†»versicolor».

b. Lupularia Ser.

3. M. lupulina Linn.
(3.) M. Willdenowii Boenningh.

c. Spirocarpus Ser.

4. M. (minima Linn.)
»viscida».

10. Lotus Linn.

a. Eulotus.

1. L. tenuis Kit. [14]
2. L. corniculatus Linn.
3. L. uliginosus Schkuhr. [15]

b. Tetragonolobus Scop.

4. L. siliquosus Linn. [16]
(4.) L. maritimus Linn.

ASTRAGALEÆ:

11. Astragalus Linn.

α. Purpurascentes:

1. A. arenarius Linn.
2. A. hypoglottis Linn.

β. Ochroleuci:

3. A. glycyphyllus Linn.

(12.) Oxytropis DC.

α. Ochroleucæ:

* Caulescentes:

1. O. pilosa DC. [11]

** Acaules:

2. O. campestris DC. [17]
(2.) O. sordida Gaud. [18]

β. Cyanescentes:

3. O. lapponica Gaud. [19]

12. Phaca Linn.

a. Cyanophaca.

1 P. astragalina DC.
2. P. oroboides DC.

b. Euphaca.

3. P. frigida Linn. [20]

B. *HEDYSAREÆ DC.*

13. Onobrychis All.

†1. O. sativa Lam.

14. Coronilla Linn.

1. C. Emerus Linn. [21]

15. Ornithopus Linn.

1. O. perpusillus Linn.

---

filiforme Sm. et forte *Linn.* sistit T. micranthum Viv. — [9]) Melil. officinalis Willd., non *Desr.* — [10]) (*Lam.*) Melil. arvensis Wallr. — [11]) (*Lam.*) — [12]) E sect.: *Grammocarpus* Ser. Melilotus Lam. — [13]) Immo »annularis». — [14]) (*Willd. enum.*) Lot. corniculatus tenuifolius Poll. — [15]) Lot. corniculatus major Ser. — [16]) Tetragonolobus Roth. — [17]) Phaca Wg. — [18]) Astragalus uralensis Linn. svec. et herbar. — [19]) Phaca Wg. helv., DC.! — [20]) (*Syst. nat.*) Phac. alpina Linn. spec., svec. et herbar. — [21]) *Emerus* major Mill. — [22]) Lathyr. latifolius

C. *VICIEÆ DC.*

16. Lathyrus Linn.

α. Ochroleuci:

1. L. pratensis Linn.

β. Purpurascentes:

* Edules:

2. L. tuberosus Linn.

** Sylvestres:

3. L. sylvestris Linn.
(4.) L. platyphyllus Retz. [22])
4. L. heterophyllus Linn.

17. Pisum Linn.

1. P. arvense Linn.

18. Orobus Linn.

α. Cirrhati:

1. O. maritimus Rchnb. [23])
2. O. palustris Rchnb. [24])

β. Appendiculati:

(3.) O. tenuifolius Roth.
3. O. tuberosus Linn.
4. O. vernus Linn.
5. O. niger Linn.

19. Vicia Linn.

α. Racemosæ:

* Perennes:

1. V. pisiformis Linn.
2. V. dumetorum Linn.
3. V. sylvatica Linn.
4. V. Orobus DC.
5. V. cassubica Linn.
6. V. tenuifolia Roth.
7. V. Cracca Linn.

** Annuæ:

8. V. villosa Roth.

β. Subracemosæ:

9. V. sepium Linn.

γ. Axillares:

10. V. sativa Linn.
11. V. angustifolia Roth. [25])
(11.) V. Bobartii Forst.
12. V. lathyroides Linn.

20. Ervum Linn.

a. Enervum.

1. E. tetraspermum Linn.

b. Ervilia.

2. E. hirsutum Linn.

c. Lens.

†3. E. Lens Linn. [26])

ORD. 23. ROSACEÆ JUSS.

A. *AMYGDALEÆ Juss.*

1. Cerasus Juss.

a. Padus Mill.

1. C. Padus DC. [27])

b. Eucerasus.

2. C. avium Moench.
†3. C. vulgaris Mill.

2. Prunus Linn.

1. P. spinosa Linn.
2. P. insititia Linn. [28])
†3. P. domestica Linn.

B. *POMACEÆ Juss.*

3. Cotoneaster Medik.

1. C. integerrimus Medik.
(1.) C. melanocarpus Fisch.

4. Pyrus Linn.

a. Eupyrus.

1. P. communis Linn. [29])
† »tomentosa».

Linn. svec. — [23]) Pisum maritimum Linn. — [24]) Lathyrus Linn. — [25]) Vic. sativa *β.* Linn. — [26]) Lens esculenta Moench. — [27]) Padus vulgaris Host. — [28]) »Varietates *prunorum* cultas, fructib. *globosis* vel *subglobosis* præditas, ex hac specie ortas esse, vix est quod dubitemus» *Koch.* — [29]) Sylvestris, »glabra». —

b. Malus Merat.

2. P. Malus Linn. [30]
 † »tomentosa».

5. Cratægus Linn.

(1.) C. oxyacanthoides Thuill. [31]
1. C. oxyacantha Auct. [32]
(1.) C. Fingerhuthii. [33]
2. C. monogyna Jacq. [34]

6. Sorbus Linn.

1. S. Aria Crantz.
 »angustifolia».
2. S. intermedia Pers. [35]
 »pinnatifida». [36]
3. S. Aucuparia Linn.
 »laciniata».

C. *SPIRÆACEÆ DC.*

7. Spiræa Linn.

a. Euspiræa.

†1. S. salicifolia Linn.

b. Ulmaria Moench.

(2.) S. denudata Hayn.
2. S. Ulmaria Linn. [37]
(2.) S. glauca K. F. Schultz.

c. Filipendula Moench.

3. S. Filipendula Linn. [38]

D. *ROSEÆ DC.*

8. Rosa Linn.

α. Caninæ:

1. R. rubiginosa Linn. [39]
(2.) R. sepium Thuill. [40]
2. R. canina Linn.
3. R. dumetorum Thuill.
(3.) R. coriifolia Fr. [41]
4. R. collina Jacq. [42]
(5.) R. tomentosa Sm.
5. R. villosa Linn. [43]
(5.) R. pomifera Herrm.

β. Pimpinellifoliæ:

6. R. cinnamomea Linn. [44]
(7.) R. acicularis Lindl. [45]
7. R. alpina Linn. [46]
8. R. pimpinellifolia Linn. [47]

E. *SANGUISORBEÆ:*

9. Poterium Linn.

1. P. Sanguisorba Linn.
 »hirtellum».

10. Sanguisorba Linn.

1. S. officinalis Linn.

---

[30]) Sylvestris. »glabra». Malus acerba Merat. Pyrus DC. — [31]) Crat. oxyacantha obtusata DC.; *3—2!—styla.* — [32]) Crat. oxyacantha vulgaris DC.; *2!—1—styla.* — [33]) Crat. oxyacantha laciniata DC. C. monogyna Fingerh., non *Jacq.; 1—styla!* — [34]) Crat. oxyacantha Linn. herbar. C. oxyacantha monostyla DC.; *1—styla! Nb.* Lobi calycini in fructu *erecti,* nec reflexi ut in C. oxyacanthæ formis. — [35]) Pyrus Ehrh. Cratægus svecica Linn. amoen. III. ed. II. pag. 436. Sorb. scandica Fr. (ex. gr. per *Galliam* usque in *Pyrenæos*). — [36]) Pyrus Ehrh. — [37]) Ulmaria palustris Moench. — [38]) Filipendula vulgaris Moench. — [39]) (*Mant.* et *herbar.*) Ros. Eglanteria Linn. svec. *Nb.* R. Eglanteria Linn. spec. et herbar.: R. lutea Mill. — [40]) Ros. inodora Fr.; specim. mea *florentina* a *svecanis* minus nihilo differunt. — [41]) Ros. crassifolia Wallm.!, qui invenit, distinxit et distribuit. — [42]) Ros. Acharii Billb. in sv. bot. — [43]) (*Herbar.:* specim. e loco in ej. svec. ed. II. pag. 463 citato, nempe *Ackerö* Suderm.) Ros. mollissima Willd. et svecan. recent. — [44]) (*Spec.* et *herbar.*) Ros. spinosissima Linn. svec. — [45]) Ros. alpina aculeata Ser. R. carelica Fr. — [46]) Ros. inermis Mill. — [47]) (*Spec.,* incl.

F. *DRYADEÆ:*

11. Agrimonia Linn.

1. A. Eupatoria Linn.
   »elata». [48])
2. A. odorata Mill.

12. Geum Linn.

1. G. strictum Ait. [49])
2. G. urbanum Linn.
   G. rivali-urbanum. [50])
   G. urbano-rivale. [51])
3. G. rivale Linn. [52])

13. Dryas Linn.

1. D. octopetala Linn.

14. Rubus Linn.

α. Chamæmori: [53])

1. R. Chamæmorus Linn.

β. Eurubi: [54])

* Herbacei:

2. R. arcticus Linn.
   R. saxatili-arcticus. [55])
   R. arctico-saxatilis. [56])
3. R. saxatilis Linn.

** Fruticosi:

4. R. idæus Linn.
   »integrifolius». [57])

γ. Ampelorubi: [58])

5. R. fruticosus Linn. [59])
6. R. cæsius Linn.
   »paniculatus». [60])

15. Fragaria Linn.

(1.) F. monophylla Willd.
1. F. vesca Linn.
2. F. elatior Ehrh.
3. F. collina Ehrh.

16. Potentilla Linn.

a. Fragariopsis.

1. P. rupestris Linn. [61])

b. Tormentilla Linn.

2. P. Tormentilla Sibth. [62])
3. P. procumbens Sibth. [63])
(3.) P. mixta Nolt. [64])

c. Eupotentilla.

α. Reptantes:

* Digitatæ:

4. P. reptans Linn.

** Pinnatæ:

5. P. anserina Linn.

Ros. spinosissima ibid., et *herbar.*) — [48]) *Suborgyalis; in dumetis* collium densis apricis. — [49]) Geum hispidum Fr. — [50]) Geum intermedium Ehrh. exsicc. n:ro. 106. G. intermedium florib. minoribus *Koch.* G. hirtum Wahlb.; legi ad *Myren* prope *Strömstad* Bahus. — [51]) Geum intermedium Willd. hort. berol., Fr. herbar. norm. VI. 50. G. intermedium florib. magnitudine G. rivalis *Koch.* — [52]) *Luxur.* sepalis in folia mutatis (Geum hybridum Wulf.) — [53]) Fruct. *flavescente.* — [54]) Fruct. *rubescente.* — [55]) Rub. castoreus Læst.; *erythropetalus.* — [56]) Rub. triflorus Fr. summ.; *leucopetalus.* — [57]) Foliol. in folium cordatum integrum confluentibus. — [58]) Fruct. *nigrescente.* — [59]) 1. *Rub. fruticosus Auct.* (fol., saltem novellis, subtus discolorib.); distinguuntur: R. Hartmanni (R. horridus Hartm., non *K. F. Schultz starg.);* R. Wahlbergii Arrhen.; R. thyrsoideus Wimm. (R. fruticosus Weih. et Nees. R. candicans Weih.; a R. fruticoso Linn. herbar., R. amoeno Portenschl., vix nisi thyrso villoso, nec velutino, discrepans); R. Radula Weih. et Nees; R. discolor Weih. et Nees; R. Sprengelii Weih. et Nees. 2. *R. corylifolius Sm.* (fol., etiam novellis, subtus viridibus); distinguuntur: R. affinis Weih. et Nees; R. plicatus Weih. et Nees (Fr. herbar. norm. V. 51 »fruticosus»); R. suberectus Anders.; R. Arrhenii (Fr. l. c. VIII. 48 »corylifolius»); R. nemorosus Hayn.; R. pruinosus Arrhen. 3. *R. glandulosus Bell.* (R. hybridus Vill.) — [60]) Legi in insul. *Söder-Koster* Bahus. — [61]) Fragariopsis Beurl. in herbar. propr. — [62]) Tormentilla erecta Linn. — [63]) Tormentilla reptans Linn. — [64]) *Culta*

β. *Fruticosæ:*

6. P. fruticosa Linn.

γ. *Potentillastra:*

* Perennes:

7. P. nivea Linn. [65])
8. P. maculata Pourr. [66])
9. P. verna Auct. [67])
10. P. opaca Linn.
11. P. cinerea Chaix. [68])
12. P. collina Wib. [69])
13. P. argentea Linn. [70])

* * Annuæ:

14. P. norvegica Linn.

d. Comarum Linn.

15. P. Comarum Nestl. [71])

17. Sibbaldia Linn.

1. S. procumbens Linn.

G. *ALCHEMILLEÆ Rchnb.*

18. Alchemilla Linn.

a. Eualchemilla.

1. A. alpina Linn.
2. A. vulgaris Linn.

b. Aphanes Linn.

3. A. Aphanes Leers. [72])

ORD. 24. ONAGRARIÆ JUSS.

A. *ONAGREÆ DC.*

1. Oenothera Linn.

†1. O. biennis Linn.

2. Epilobium Linn.

a. Chamænerium (Scop.) Tausch.

1. E. Gesneri Vill. [73])

b. Euepilobium.

2. E. hirsutum Linn.
(2.) E. intermedium Mérat. [74])
3. E. parviflorum Schreb.
»verticillatum».
(3.) E. rivulare Wg. [75])
4. E. montanum Linn.
»verticillatum».
(4.) E. collinum C. C. Gmel. [76])
5. E. roseum Schreb. [77])
(6.) E. obscurum Schreb. [78])
6. E. tetragonum Linn. [79])
»ambiguum». [80])
(6.) E. chordorhizum Griseb. [81])
(6.) E. Lamyi F. W. Schultz. [82])
7. E. palustre Linn.
»nanum».
8. E. lineare Mühlenb. [83])
9. E. Hornemanni Rchnb. [84])

---

transiit in præcedentem, subsequenti simillima. — [65]) *Var.* »fol. utrinq. viridibus» *Wg.* — [66]) Potent. verna Linn. herbar.; *var.* foliol. profundius incisis, nec non fol. inferiorib. sub—3—foliolatis. — [67]) Vide sub Potent. maculata. — [68]) (*Vill.*) Potent. incana Fr. (non *Lam.:* P. subacaulis Linn.) — [69]) Huc: Potent. sordida Fr. (P. intermedia Linn. herbar.) — [70]) Huc: Fr. herbar. norm. IV. 64 »sordida». — [71]) Comarum palustre Linn. Potent. palustris Scop. *Nb.* Hæc et P. rupestris vel *ambæ* excludendæ vel *ambæ* retinendæ. — [72]) Aphanes arvensis Linn. Alchemilla Scop. — [73]) Epil. *angustifolium vix.* Chamænerium Gesneri Beurl. in bot. not. 1853 pag 184. — [74]) Epil. hirsutum villosissimum Koch; *Oeland.!* — [75]) Epil. parviflorum subglabrum Koch. — [76]) Epil. montanum minus Wimm. et Grab. *Nb.* Vidi specim. E. hypericifolii Tausch *smolandicum* ex inscriptione, *qua fide* nescio. — [77]) *Nb.* Epil. purpureum Fr. (E. persicinum Rchnb.) cum *Koch* aliisq. omitto. — [78]) Fr. herbar. normale VIII. 41; *opacum.* — [79]) Fr. herbar. norm. VIII. 42; *nitidum.* — [80]) Epil. virgatum ambiguum Fr. summ., herbar. norm. II. 46 »virgatum». — [81]) Epil. virgatum Fr. summ., herbar. norm. X. 46. — [82]) *Subpetiolatum;* a me olim prope *Jerla* Holmiæ lectum. — [83]) Sec. *Fr.* Epil. nutans Sommerf., non *Schmidt.* — [84]) Fr. herbar. norm. VIII. 44! —

10. E. alpinum Linn. [85]
11. E. sudeticum Beurl. [86]
12. E. alsinifolium Vill. [87]

B. *CIRCÆEÆ DC.*

3. Circæa Linn.

1. C. alpina Linn.
2. C. intermedia Ehrh. [88]
3. C. luteliana Linn.

ORD. 25. LYTHRARIÆ JUSS.

1. Lythrum Linn.

1. L. Salicaria Linn.

2. Peplis Linn.

1. P. Portula Linn.

ORD. 26. CALLITRICHINEÆ LINK.

1. Callitriche Linn. [89]

(1.) C. stagnalis Scop.
(1.) C. platycarpa Kütz.
1. C. verna Linn. [90]
(2.) C. minima Hopp. [91]
2. C. angustifolia Hopp. [92]
3. C. autumnalis Linn.

ORD. 27. CERATOPHYLLEÆ GRAY.

1. Ceratophyllum Linn.

1. C. submersum Linn.
2. C. demersum Linn.

ORD. 28. HALORAGEÆ R. BR.

1. Myriophyllum Linn.

1. M. verticillatum Linn.
(1.) M. pectinatum DC.
2. M. spicatum Linn.
3. M. alterniflorum DC.

2. Hippuris Linn.

1. H. vulgaris Linn.
»ramigera».
»fluitans».
(1.) H. maritima Hellen.

ORD. 29. ELATINEÆ CAMB.

1. Elatine Linn.

α. Trimeræ:

1. E. (triandra Schkuhr.)
(1.) E. callitrichoides Rupr.
2. E. hexandra DC.

β. Tetrameræ:

(3.) E. orthosperma Düb.
3. E. Schkuhriana Hayn. [93]
(3.) E. campylosperma Seub.

ORD. 30. PORTULACACEÆ JUSS.

1. Montia Linn.

1. M. fontana Linn.
(1.) M. rivularis C. C. Gmel.

ORD. 31. CRASSULACEÆ DC.

1. Tillæa Linn.

1. T. aquatica Linn. [94]
(1.) T. prostrata Schkuhr.

2. Rhodiola Linn.

1. R. rosea Linn. [95]

---

[85]) *Sv. bot. tab. 707 fig. 1, optima.* — [86]) (*Bot. not. 1853 pag. 185.*) Epil. nutans Schmidt; *Norveg.* (?) ex Fr. mant. II. — [87]) Epil. origanifolium Lam. — [88]) Circ. alpina *β.* DC. — [89]) *Callitr. aquatica* Huds. — [90]) In Rchnb. icon. depictæ sunt *Callitricharum* formæ ultra XL!, ad periclitandum ansam præbentes. — [91]) Callitr. cæspitosa F. W. Schultz; *terrestris.* — [92]) Callitr. hamulata Kütz.; *aquatilis.* — [93]) Elat. Hydropiper Linn. pr. p:te. — [94]) *Bulliarda* DC. — [96]) Sedum Rhodiola

3. Sedum Linn.

a. Eusedum. [96]

α. Planifolia:

†1. S. hybridum Linn.

β. Teretifolia:

2. S. reflexum Linn. [97]
3. S. sexangulare Linn.
4. S. acre Linn.
5. S. annuum Linn.

b. Cepæa. [98]

α. Teretifolia:

6. S. anglicum Huds.
7. S. album Linn.
8. S. villosum Linn.

β. Planifolia:

9. S. Telephium Linn.
»angustifolium».
(9.) S. purpurascens Koch.

4. Sempervivum Linn.

1. S. tectorum Linn.

ORD. 32 CUCURBITACEÆ JUSS.

1. Bryonia Linn.

1. B. alba Linn.

ORD. 33. GROSSULARIEÆ DC.

1. Ribes Linn.

a. Grossularia Mill.

1. R. Uva crispa Linn. [99]
†(1.) R. Grossularia Linn.
†(1.) R. reclinatum Linn.

b. Euribes.

2. R. nigrum Linn.
3. R. rubrum Linn. [100]
† »sativum».
4. R. alpinum Linn.

ORD. 34. SAXIFRAGACEÆ DC.

1. Saxifraga Linn.

a. Micranthes Haw.

1. S. hieracifolia Waldst. et Kit. [1]
2. S. nivalis Linn. [1]
»tenuior». [2]

b. Eusaxifraga.

α. Saxifragastra:

3. S. rivularis Linn.
4. S. cernua Linn.
5. S. granulata Linn.

β. Dactyloideæ:

(6.) S. minuta Pollin.
6. S. tridactylites Linn.
7. S controversa Sternb. [3]
8. S. cæspitosa Linn.

c. Chondrosea Haw.

9. S. Cotyledon Linn. [4]
10. S. (Aizoon Jacq.) [5]
»minor». [6]

DC. — [96]) Petala *lutea.* — [97]) *Nb.* Sed. rupestre *α.* Linn. spec. ed. I. et herbar. est S. amplexicaule DC. (Sempervivum anomalum Lag.), pro quo vel pro cujus varietate *Linné* habuit nostrum, donec (*fl. svec. ed. II. pag. 463*) ex speciminib. *gottlandicis* speciem distinctam, nomine S. *reflexi* salutatam agnovit. — [98]) Petala *alba* (vel subvirentia), *cærulescentia, rubella.* — [99]) Grossularia Mill. — [100]) Rib. sylvestre Lam. — [1]) Micranthes Haw. — [2]) Per alp. *Jemtl.* frequ. — [3]) Saxifr. tridactylites *β.* Linn. S. petræa Gunn., non *Linn.* — [4]) Chondrosea pyramidalis Haw.; var. ut subsequens. — [5]) Chondrosea Haw. — [6]) Chondrosea Aizoon mi-

d. Antiphylla Haw.
11. S. oppositifolia Linn. [7]
e. Leptasea Haw.
12. S. aizoides Linn. [8]
f. Hirculus Haw.
13. S. Hirculus Linn. [9]
g. Spathularia Haw. [10]
14. S. stellaris Linn. [11]
(14). S. foliolosa R. Br.

2. Chrysosplenium Linn.
1. C. alternifolium Linn.
2. C. oppositifolium Linn.

ORD. 35. ADOXEÆ E. MEY.

1. Adoxa Linn.
1. A. Moschatellina Linn.

ORD. 36. UMBELLIFERÆ JUSS.

1. Hydrocotyle Linn.
1. H. vulgaris Linn.

2. Sanicula Linn.
1. S. europæa Linn.

3. Eryngium Linn.
1. E. maritimum Linn.

4. Bupleurum Linn.
1. B. tenuissimum Linn.

5. Falcaria Host.
1. F. Rivini Host.

6. Bunium Linn.
1. B. denudatum DC. [12]

7. Carum Linn.
1. C. Carvi Linn.

8. Pimpinella Linn.
1. P. Saxifraga Linn.
»dissecta».
2. P. nigra Willd. [13]
3. P. magna Linn.
»dissecta».

9. Aegopodium Linn.
1. A. Podagraria Linn.

10. Apium Linn.
a. Petroselinum Hoffm.
†1. A. Petroselinum Linn. [14]
b. Euapium DC.
2. A. graveolens Linn.

11. Helosciadium Koch.
1. H. inundatum Koch.

12. Sium Linn.
a. Berula Koch.
1. S. angustifolium Linn. [15]
b. Eusium.
1. S. latifolium Linn.
(1.) S. longifolium Presl.

13. Cicuta Linn.
1. C. virosa Linn.
(1.) C. angustifolia Kit.

14. Oenanthe Linn.
a. Euoenanthe.
1. O. fistulosa Linn.

---

nor Haw. — [7]) Antiphylla cærulea Haw. — [8]) Leptasea Haw. — [9]) Hirculus ranunculoides Haw. — [10]) Calyx liberrimus refractus (in *Hirculo* liber reflexus, in *Leptasea* subliber patens, in *ceteris* ovario adnatus, lobis erectiusculis.) *Nb.* Robertsonia Haw. vix differt. — [11]) Spathularia Haw. — [12]) *Conopodium* Koch. — [13]) Pimp. Saxifraga *β.* DC. — [14]) Petroselinum sativum Hoffm. — [15]) Berula

b. Phellandrium Linn.

2. O. Phellandrium Lam. [16])

15. Aethusa Linn.

1. A. Cynapium Linn.

16. Conium Linn.

1. C. maculatum Linn.

17. Chærophyllum Linn.

a. Euchærophyllum.

1. C. temulum Linn.
†2. C. bulbosum Linn.
3. C. sylvestre Linn.

b. Cerefolium Bess.

4. C. Cerefolium Crantz. [17])

18. Myrrhis Scop.

†1. M. odorata Scop.

19. Scandix Linn.

1. S. Pecten Linn.

20. Anthriscus Pers.

1. A. vulgaris Pers.

21. Torilis Gærtn.

1. T. Anthriscus C. C. Gmel.

22. Daucus Linn.

1. D. Carota Linn.
† »sativa».

23. Athamantha Linn.

1. A. Libanotis Linn. [18])

24. Selinum Linn.

a. Cnidium Cuss.

1. S. lineare Schum. [19])

b. Conioselinum Fisch.

2. S. Gmelini Bray. [20])

c. Euselinum.

3. S. Carvifolia Linn.

25. Peucedanum Linn.

a. Thysselinum Hoffm.

1. P. palustre Moench. [21])

b. Oreoselinum MB.

2. P. Oreoselinum Moench. [22])

c. Silaus Bess.

3. P. Silaus Linn. [23])

26. Anethum Linn.

†1. A. graveolens Linn.

27. Ligusticum Linn.

1. L. scoticum Linn. [24])

28. Pleurospermum Hoffm.

1. P. austriacum Hoffm.

29. Levisticum Koch.

†1. L. officinale Koch.

30. Pastinaca Linn.

1. P. sativa Linn.
† »esculenta».

---

angustifolia Koch. — [16]) Phellandrium aquaticum Linn. — [17]) Cerefolium sativum Bess. — [18]) *Libanotis* montana All — [19]) (*Sælland.*) Cnidium venosum Koch. — [20]) Conioselinum tataricum Fisch. C. Fischeri Wimm. et Grab. — [21]) Thysselinum Hoffm. — [22]) Oreoselinum legitimum MB. — [23]) Silaus pratensis Bess. *Nb.* Sect. *Eupeucedanum* DC. (Peuc. officinale Linn.) in *Scand.* deest. — [24]) *Halloscias* Fr. *Nb.* Quum e *Ligusticis* Linnæanis prototypis, nempe L. scotico, austriaco, Levistico et peloponesiaco, hæc tria jam pridem in tot diversa genera (*Pleurospermum, Levisticum* et *Molopospermum*) abierunt, nostro *unico residuo,* ne genus antesignano carens corruptioni! cedat vel oblivioni, *Linnæanum* rite resti-

31. Heracleum Linn.

a. Euheracleum DC.

1. H. sibiricum Linn. [25]
(1.) H. angustifolium Linn.

b. Sphondylium Hoffm.

2. H. Sphondylium Linn. [26]

32. Laserpitium Linn.

1. L. latifolium Linn.

33. Imperatoria Linn.

1. I. Ostruthium Linn.

34. Angelica Linn.

a. Euangelica.

1. A. sylvestris Linn.
»litoralis». [27]

b. Archangelica Hoffm.

2. A. Archangelica Linn. [28]
»litoralis». [29]

ORD. 37. ARALIACEÆ JUSS.

1. Hedera Linn.

1. H. Helix Linn.

ORD. 38. CORNEÆ DC.

1. Cornus Linn.

α. Herbaceæ:

1. C. svecica Linn.

β. Fruticosæ:

2. C. sanguinea Linn.

ORD. 39. RHAMNEÆ R. BR.

1. Rhamnus Linn.

a. Frangula.

1. R. Frangula Linn. [30]

b. Eurhamnus.

2. R. catharticus Linn.

ORD. 40. CELASTRINEÆ R. BR.

A. *EUONYMEÆ DC.*

1. Euonymus Linn.

1. E. europæus Linn.

B. *AQUIFOLIACEÆ DC.*

2. Ilex Linn.

1. I. Aquifolium Linn.

ORD. 41. OLEACEÆ LINDL.

A. *OLEINEÆ DC.*

1. Syringa Linn.

†1. S. vulgaris Linn.

2. Ligustrum Linn.

1. L. vulgare Linn.

B. *FRAXINEÆ Bartl.*

3. Fraxinus Linn.

1. F. excelsior Linn.

ORD. 42. LORANTHACEÆ DON.

1. Viscum Linn.

1. V. album Linn.

---

tuitur nomen. — [25]) (*Mant.*) Heracl. Sphondylium Linn. svec. et herbar. H. flavescens Baumg. — [26]) (*Spec.*) Sphondylium Branca Scop. — [27]) A *nonnullis* cum Angel. Archangelica litorali confusa. — [28]) Archangelica officinalis Hoffm. — [29]) Vide Beurl. in bot. not. 1854 pag. 131. — [30]) Frangula vulgaris Rchnb. —

ORD. 43. ARISTOLOCHIEÆ JUSS. [31]

1. Aristolochia Linn.

†1. A. Clematitis Linn.

2. Asarum Linn.

1. A. europæum Linn.

ORD. 44. CAPRIFOLIACEÆ JUSS.

1. Lonicera Linn.

a. Caprifolium Juss.

1. L. Periclymenum Linn. [32]

b. Eulonicera.

α. Lonicerastra:

2. L. Xylosteum Linn.

β. Isicæ:

3. L. cærulea Linn.

2. Linnæa (Gron.) Linn.

1. L. borealis Linn.

ORD. 45. RUBIACEÆ JUSS.

1. Sherardia Linn.

1. S. arvensis Linn.

2. Asperula Linn. [33]

α. Cynanchicæ:

1. A. tinctoria Linn. [34]

β. Galioideæ:

2. A. odorata Linn. [35]

3. Galium Linn.

a. Eugalium DC.

α. Trichogalia:

1. G. triflorum Michx.
2. G. rotundifolium Linn.

β. Platygalia:

3. G. boreale Linn.

γ. Galiastra:

4. G. verum Linn.
G. mollugo-verum.
G. vero-mollugo.
5. G. Mollugo Linn.
6. G. saxatile Linn. [36]
7. G. sylvestre Poll. [37]
(7.) G. alpestre Gaud. [38]
8. G. uliginosum Linn.
9. G. palustre Linn.
10. G. trifidum Linn.

b. Aparine Moench.

11. G. Aparine Linn. [39]
(11.) G. Vaillantii DC. [40]
12. G. spurium Linn. [41]
†13. G. tricorne With.

ORD. 46. VALERIANEÆ DC.

1. Valerianella Poll.

1. V. Morisonii DC. [42]
2. V. olitoria Poll. [42]
»lasiocarpa».

2. Valeriana Linn.

1. V. dioica Linn.
(2.) V. collina Wallr.

---

[31]) Incertæ sedis. — [32]) Caprifolium distinctum Moench. — [33]) *Asperularum* transitus in *Galia* vix dubius; vide ex. gr. Asperul. galioidem MB.: Gal. glaucum Linn. — [34]) Galium tinctorium Scop. — [35]) Galium odoratum Scop. G. Matrisylva Wigg.; G. trifloro Michx. (G. svaveolenti Wg.) maxime affinis. — [36]) (*Svec. ed. II. pag. 463.*) Gal. hercynicum Weig. — [37]) Gal. læve Thuill., DC. — [38]) (*Roem. et Schult.*), DC.; *insul. balt.* — [39]) *Auct.* Aparine hispida Moench. — [40]) (*Gall., 1805.*) Gal. Aparine Linn. herbar. G. infestum Waldst. et Kit. (1808.) — [41]) »Galii Vaillantii var. leiocarpa?» *DC.* — [42]) *α.*: *leiocarpa.* —

2. V. officinalis Linn.
(2.) V. excelsa Poir.
(2.) V. sambucifolia Mik. [43])

3. Sambucus Linn.

α. Herbaceæ:

1. S. Ebulus Linn.

β. Fruticosæ:

2. S. nigra Linn.

4. Viburnum Linn.

1. V. Opulus Linn. [44])

ORD. 47. COMPOSITÆ LINN.

A. *TUBIFLORÆ DC.*

EUPATORIACEÆ:

1. Eupatorium Linn.

1. E. cannabinum Linn.

2. Tussilago Linn.

a. Petasites Gærtn.

1. T. Petasites Linn. [45])
2. T. alba Linn. [46])
3. T. spuria Retz. [47])

b. Nardosmia Cass.

4. T. frigida Linn. [48])

c. Eutussilago.

5. T. Farfara Linn.

SENECIONEÆ:

3. Senecio Linn.

a. Eusenecio.

α. Seneciastra:

1. S. vulgaris Linn.
2. S. viscosus Linn.
3. S. sylvaticus Linn.

β. Jacobeæ:

4. S. tenuifolius Jacq. [49])
5. S. Jacobæa Linn.
(6.) S. barbareæfolius Krock. [50])
6. S. aquaticus Huds.

γ. Doriæ:

7. S. paludosus Linn.
†8. S. saracenicus Linn.

b. Cineraria Linn.

α. Heloserides:

9. S. palustris DC. [51])

β. Tephroserides:

10. S. campestris DC. [51])

4. Arnica Linn.

1. A. alpina Olini. [52])
2. A. montana Linn.

ASTERINEÆ:

5. Bellis Linn.

1. B. perennis Linn.

6. Erigeron Linn.

α. Erigerastra: [53])

1. E. uniflorus Linn. [54])
2. E. alpinus Linn.
»oligocephalus».

---

[43]) »An a Valer. officinali satis differt» *DC.* — [44]) *Opulus* vulgaris Borkh. — [45]) Petasites vulgaris *submasculus* DC. (*subfemin.:* Tuss. hybrida Linn.) — [46]) Petasites albus *submasculus* DC. (*subfemin.:* Tuss. ramosa Hopp.) — [47]) Petasites tomentosus *subfemineus* DC. (*submasc.:* plerisq. ignot. — [48]) Nardosmia frigida *submascula* DC. (*subfemin.:* stirps *sibirica.*) — [49]) »*Linnés* ursprungliga, i *Sk. Res.* omnämnda Senec. *erucifolius* är, enl. hans herbar., en form af S. sylvaticus» *C. Hartm.* — [50]) Senec. aquaticus *β.* DC. — [51]) Cineraria Linn. — [52]) (*Arnic., 1799.*) A. angustifolia Vahl (1816.) — [53]) (Trimorphæa Cass.) — [54]) A subse-

3. E. Droebachensis Müll. [55])
(3.) E. elongatus Ledeb. [56])
4. E. acris Linn. [57])
(4.) E. serotinus Weih. [58])

β. Conyzoidei: [59])

†5. E. canadensis Linn.

7. Chrysocoma Linn.

1. C. Linosyris Linn. [60])

8. Solidago Linn.

1. S. Virgaurea Linn.

9. Aster Linn.

1. A. Tripolium Linn. [61])

10. Inula Linn.

a. Pulicaria Gærtn.

1. I. Pulicaria Linn. [62])

b. Euinula.

α. Britanicæ:

2. I. Britanica Linn.

β. Bubonia:

3. I. salicina Linn.
4. I. ensifolia Linn.

c. Corvisartia Merat.

5. I. Helenium Linn. [63])

HELIANTHEÆ:

11. Bidens Linn.

1. B. tripartita Linn.
2. B. cernua Linn.
»radiata». [64])

ANTHEMIDEÆ:

12. Anthemis Linn.

a. Euanthemis.

1. A. tinctoria Linn.

b. Chamæmelum (All.) Cass.

2. A. arvensis Linn. [65])

c. Maruta Cass.

3. A. Cotula Linn. [66])

13. Matricaria Linn.

a. Anactidea DC.

†1. M. discoidea DC. [67])

b. Eumatricaria.

2. M. Chamomilla Linn.
(2.) M. svaveolens Linn. [68])

c. Tripleurospermum C. H. Schultz.

3. M. inodora Linn. [69])
(3.) M. maritima Linn. [70])

14. Chrysanthemum Linn.

a. Leucanthemum Lam.

1. C. Leucanthemum Linn. [71])

b. Euchrysanthemum.

2. C. segetum Linn.

c. Pyrethrum Gærtn.

3. C. Parthenium Pers. [72])

15. Achillea Linn.

a. Ptarmica DC.

1. A. Ptarmica Linn. [73])

---

quente non *specifice* differt ex DC. — [55]) Pedunc. *inferiores oligocephali.* — [56]) Huc: Erig. politus Fr.; pedunc. *omnes monocephali.* — [57]) Pedunc. *inferiores oligocephali.* — [58]) Erig. rigidus Fr.; pedunc. *omnes monocephali.* — [59]) (Erigeron Cass.); maxime affines *Conyzis* e sect.: *Dimorphantes* Cass. — [60]) *Linosyris* vulgaris Cass. — [61]) *Tripolium* vulgare Nees. — [62]) Pulicaria vulgaris Gærtn. — [63]) Corvisartia Merat. — [64]) Coreopsis Bidens Linn. — [65]) Chamæmelum arvense All. — [66]) Maruta foetida Cass. M. Cotula DC. — [67]) *Upsal.,* ex hort. botan. disseminata. — [68]) (*Svec.* et *herbar.*); ligul. *deflexæ* (paucæ). — [69]) Tripleurospermum inodorum C. H. Schultz. — [70]) Tripleurospermum maritimum Hartm. — [71]) Leucanthemum vulgare Lam. — [72]) Pyrethrum Sm. — [73]) Ptarmica vul-

b. Euachillea.

2. A. Millefolium Linn.

16. Tanacetum Linn.

1. T. vulgare Linn.
(1.) T. boreale Fisch.

17. Cotula Linn.

1. C. coronopifolia Linn.

18. Artemisia Linn.

α. Absinthia:

1. A. norvegica Vahl. [74])
2. A. rupestris Linn.
3. A. Absinthium Linn.

β. Artemisiastra:

(4.) A. coarctata Ad. Afz. [75])
4. A. vulgaris Linn.
5. A. (laciniata Willd.) »oelandica».

γ. Dracunculi:

6. A. campestris Linn.

δ. Seriphidia:

7. A. maritima Linn.

GNAPHALIEÆ:

19. Filago Linn.

a. Impia Bl. et Fing.

1. F. (germanica Linn.) [76]) »pyramidata». [77])

b. Eufilago.

2. F. montana Linn.
(2.) F. arvensis Linn.
3. F. (minima Pers.) [78]) »arvensis». [79])

20. Gnaphalium Linn.

a. Eugnaphalium.

(1.) G. acaule Sieb. [80])
1. G. supinum Linn. [81])
(1.) G. fuscum Scop. [82])
2. G. norvegicum Gunn. [83])
3. G. sylvaticum Linn. [84])
(4.) G. pilulare Wg. [85])
4. G. uliginosum Linn.
(4.) G. nudum Hoffm. [86])
5. G. luteo-album Linn.

b. Helichrysum Gærtn.

6. G. arenarium Linn. [87])

c. Antennaria Gærtn.

7. G. dioicum Linn. [88]) »corymbosum».
8. G. alpinum Linn. [89])
9. G. carpathicum Wg. [90])

CYNAREÆ:

21. Saussurea DC.

1. S. alpina DC.

22. Centaurea Linn.

α. Jaceæ:

1. C. Jacea Linn.
2. C. nigra Linn.
3. C. phrygia Linn. [91])

---

garis DC. — [74]) (»Ined.» *DC.*), Fr. Artem. rupestris Müll. fl. dan., non *Linn.* — [75]) *Oeland.!* — [76]) Impia Bl. et Fing. — [77]) Fil. pyramidata Linn. svec. Impia Bl. et Fing. — [78]) (*Synops. II. pag. 422.*) Gnaphalium minimum Sm. — [79]) Fr. herbar. norm. I. 3. Fil. arvensis Wg., non *Linn.;* ad F. minimam Pers. se habet fere ut F. arvensis Linn. ad F. montanam ej. — [80]) (*Exsicc.*) — [81]) (*Syst. nat.*) Gnaph. procumbens Linn. herbar. — [82]) Capitul. in *racemulum* disposita. — [83]) Gnaph. sylvaticum fuscatum Wg. — [84]) De modificationib. vide Læst. in bot. not. 1856 pag. 85—86. — [85]) (*Lapp.*); achæn. *muriculata.* — [86]) Supra *Fucos* in litora marina ejectos. — [87]) Helichrysum DC. — [88]) Antennaria dioica Gærtn. — [89]) Antennaria alpina DC. — [90]) Antennaria carpathica Bl. et Fing. — [91]) »No-

β. Cyani:
4. C. Cyanus Linn.
γ. Lopholomæ:
5. C. Scabiosa Linn.

23. Serratula Linn.
1. S. tinctoria Linn.

24. Cirsium Scop.
a. Breea Less.
1. C. arvense Scop. [92])
b. Eriolepis Cass.
2. C. lanceolatum Scop. [93])
c. Eucirsium.
α. Apterocaulia:
* Ochroleuca:
C. acauli-oleraceum.
3. C. oleraceum Scop.
C. heterophyllo-oleraceum.
** Purpurea:
C. oleraceo-heterophyllum.
4. C. heterophyllum All.
C. acauli-heterophyllum.
C. heterophyllo-acaule.
5. C. acaule All.
C. oleraceo-acaule.
β. Pterocaulia:
6. C. canum MB.
7. C. palustre Scop.

25. Carduus Linn.
1. C. crispus Linn.
2. C. acanthoides Linn.
3. C. nutans Linn.

26. Onopordon Linn.
1. O. Acanthium Linn.

27. Lappa Lam.
1. L. tomentosa Lam.
2. L. minor DC. [94])
3. L. major Gærtn. [95])

28. Carlina Linn.
1. C. vulgaris Linn.

29. Echinops Linn.
†1. E. sphærocephalus Linn.

B. *LIGULIFLORÆ DC.*

30. Tragopogon Linn.
†1. T. porrifolius Linn.
2. T. pratensis Linn. [96])
(2.) T. minor Fr. [97])

31. Scorzonera Linn.
†1. S. hispanica Linn.
2. S. humilis Linn. [98])

32. Hypochæris Linn.
a. Achyrophorus (Scop.) DC.
1. H. maculata Linn. [99])
b. Euhypochæris.
2. H. radicata Linn.
3. H. glabra Linn.

33. Leontodon Linn.
(1.) L. corniculatus Kit. [100])
(1.) L. alpinus Hopp.
1. L. Taraxacum Linn. [1])
(1.) L. palustris Sm.

---

men *specificum* non hanc in *Phrygia* repertam sed involucro quasi *phrygio opere* ornato donatam significat» *DC.* — [92]) Breea arvensis Less. — [93]) Eriolepis lanceolata Cass. — [94]) Lapp. glabra *α.* Lam. — [95]) Lapp. glabra *β.* Lam. — [96]) *Var.* fol. margine undulato-crispis. — [97]) Tragop. pratensis micranthes Wimm. — [98]) (*Svec.*) — [99]) Achyrophorus maculatus Scop. — [100]) (*Schult.*) — [1]) *Dens*

34. Apargia (Scop.) Willd.

a. Oporinia Don.

1. A. autumnalis Willd. [2]
 »salina». [3]

(1.) A. pratensis Link. [4]

(1.) A. Taraxaci Sm. [5]

b. Euapargia.

2. A. hastilis Willd.

(2.) A. hispida Willd.

35. Picris Linn.

1. P. hieracioides Linn.

36. Hieracium Linn. [6]

a. Pilosella.

1. H. cymosum Auct. [7]
 H. fallax Willd. [8]
 H. prælatum Vill. [9]
2. H. Auricula Auct. [10]
3. H. aurantiacum Linn. [11]
 H. sphærocephalum Froel. [12]
4. H. Pilosella Linn. [13]

b. Euhieracium.

5. H. alpinum Linn. [14]
6. H. murorum Linn. [15]
7. H. rigidum Hn. [16]
 H. Friesii Hn. [17]
8. H. sylvestre Tausch. [18]
9. H. prenanthoides Vill. [19]
10. H. ramosum Waldst. et Kit. [20]
11. H. umbellatum Linn. [21]

Leonis! (Leontodon.) — [2]) Oporinia Don. — [3]) (Aspegr.); fol. *subintegra, crassiuscula.* — [4]) Involucr. *fusco-hirsutum.* — [5]) Hieracium Linn. (*non* Leontodon Taraxaci Lois.); involucr. *dense nigro-hirsutum.* — [6]) In *Hieraciis* demonstrandis sibimet ipsi antecelluit Illustr. *Fries,* cujus *herbar. norm.,* ut expositio luculentior evaderet, infra citavi, speciminib. cultis vel recedentibus in parenthesi commemoratis, perpaucis omissis. — [7]) XIII. 15; Hier. setigerum Tausch: XIII. 13; H. sabinum Seb. et Maur.: XIII. 16; H. glomeratum Froel.: X. 10. XIII. 12; H. Nestleri Vill.: XIII. 14 (cum modificat. sequente stolonifera confluens); H. pratense Tausch (»conglomeratum»: VI. 10.) *Nb.* Ex C. Hartm. nec species nostra nec H. cymosi nomen in Linn. herbar. occurrit. — [8]) VI. 8, 9, IX. 6, XIII. 11. Hier. Auricula Linn. herbar. »quantum videre licuit» *C. Hartm.;* H. fallacinum F. W. Schultz: XIII. 9 dextr. (sinistr., XIII. 8 »floribundum».) — [9]) XIV. 12; stoloniferum: VI. 7; Hier. piloselloides Vill.: XIII. 10 »hyperboreum». — [10]) VI. 6. Hier. dubium Linn. herbar., ex C. Hartm.; monocephalum: XI. 14; majus: IX. 7 »svecicum»; stoloniflorum (*Holmiæ* pluribi.) — [11]) X. 9, XIII. 7 »fuscum». Huc quoque Hier. decolorans Fr. — [12]) Hier. cernuum Fr. — [13]) VI. 4, 5 »auriculæforme», IX. 8; sæpe discolor et porro (subfurcatum bifurcumve) di-rarius oligo-cephalum atque insimul stoloniflorum. — [14]) X. 7, 8, XII. 25. — [15]) (*Herbar.,* nempe Hier. pellucidum Wg.): II. 7! »sylvaticum», 8 »vulgatum a», (10, 11 »diaphanum»). XII. 19 »cæsium» specim. majus, 22, 23; H. angustifolium C. C. Gmel.: II. 9 »vulgatum b»; H. sylvaticum Sm. et Auct.: XII. 20; H. bifidum Kit.: X. 6, XII. (19 specim. minus: forma fol. maculatis), 21 »plumbeum», XIII. 21 »incisum»; H. rupestre All.: (II. 15, in umbra enatum), IX. 5 (H. pallescens Fr.), X. 5, XII. 16 »oreades», 17 »saxifragum», XIII. (17 »pallidum»), 17 b, 24 »norvegicum rufescens», quibus forte addendum H. argenteum Fr.; H. onosmoides Fr.: XIII. (19), 20. — [16]) III. 4, V. 1, IX 3, XII. 14, (15 dextr.), XIII. 22 »vulgatum typicum», 23, 25 »norvegicum». — [17]) II. 12, 13, 14, (IX. 2, XII. 13 sinistr., 15 »lapponicum» mutat. in »lappifolium» sinistr.) — [18]) XI. 7 »crocatum», 9 dextr., 10 »boreale», 12 »cydonæfolium»: Hier. dovrense Fr., (XII. 13 dextr.), quibus, ex specim. ad lacum *Åre* Jemtl. lect., additur H. strictum Fr. (Ab H. sabaudo Linn., in ruderis areis *upsaliensis* subinquilino, vix differt XII. 11 »crocatum auratum».) — [19]) IX. 4 dextr., XI. 9 »corymbosum» sinistr. (Hier. lycopifolii Froel., in *Norveg.* obvii?, specim. culta: IX. 4 sinistr., XI. 8, XII. 8 »elatum», 9 dextr.) — [20]) (XI. 11, cult.) Hier. dovrense Lindeb. in sched., non *Fr.;* in planta *norvegica* involucrum *subnigrescens.* — [21]) IX. 1; Hier. æstivum

c. **Aracium** (Neck.) Less.

12. H. paludosum Linn. [22])

37. Crepis Linn.

a. **Intybus** Fr.

1. C. præmorsa Tausch. [23])
2. C. multicaulis Ledeb. [24])

b. **Eucrepis** DC.

3. C. nicæensis Balb.
4. C. biennis Linn.
5. C. tectorum Linn.

(5.) C. segetalis Roth.

38. Arnoseris Gærtn.

1. A. pusilla Gærtn.

39. Lapsana Linn.

1. L. communis Linn.

40. Lactuca Linn.

a. **Mycelis** Cass.

1. L. muralis Fresen. [25])

b. **Eulactuca.**

2. L. Scariola Linn.

41. Sonchus Linn.

a. **Eusonchus** DC.

α. Annui:

1. S. oleraceus Linn. [26])

(1.) S. asper Vill. [27])

β. Perennes:

2. S. arvensis Linn. »litoralis». [28])
3. S. palustris Linn.

b. **Mulgedium** Cass.

4. S. sibiricus Linn. [29])
5. S. alpinus Auct. [30])

42. Cichorium Linn.

1. C. Intybus Linn.

ORD. 48. AMBROSIACEÆ LINK.

1. Xanthium Linn.

†1. X. strumarium Linn.

ORD. 49. DIPSACEÆ DC.

1. Dipsacus Linn.

†1. D. pilosus Linn.

2. Scabiosa Linn.

a. **Trichera** Schrad.

1. S. arvensis Linn. [31])

b. **Euscabiosa.**

2. S. Columbaria Linn.
3. S. svaveolens Desf.

c. **Succisa** Moench.

4. S. Succisa Linn. [32])

ORD. 50. PLANTAGINEÆ R. BR.

1. Plantago Linn.

α. Coronopi:

* Serrariæ:

1. P. Coronopus Linn.

Fr.: XI. 5. — 22) Aracium Monn. — 23) Intybus præmorsus Fr. — 24) Intybus Th. Fr. in bot. not. 1857 pag. 181. — 25) Mycelis Rchnb. — 26) Sonch. lævis Vill. — 27) Sonch. oleraceus var. Linn. — 28) Sonch. maritimus Linn. amoen. — 29) Mulgedium sibiricum Less. — 30) Mulgedium alpinum Less. *Nb.* Casu infausto *Linné nostrum* sub nomine Sonchi canadensis, *exoticum* sub S. alpini nomine descripsit et in herbar. adservavit. — 31) Trichera Schrad. — 32) Succisa

(1.) P. coronopifolia Roth. [33])

* * Serpentariæ:

2. P. maritima Linn.

(2.) P. dentata Roth.

β. Plantaginastra:

3. P. lanceolata Linn.

»capitellata».

(3.) P. dubia Liljebl. [34])

4. P. media Linn.

»longifolia». [35])

5. P. major Linn.

»scopulorum».

(5.) P. minima DC. [36])

6. P. tenuiflora Waldst. et Kit. [37])

2. Littorella Berg.

1. L. juncea Berg.

ORD. 51. PLUMBAGINEÆ VENT.

1. Statice Linn.

a. Armeria Willd.

1. S. Armeria Linn. [38])

(1.) S. arctica. [39])

(1.) S. maritima Mill. [40])

b. Eustatice.

2. S. Limonium Linn. [41])

(2.) S. Pseudolimonium Rchnb. [42])

ORD. 52. GLOBULARIEÆ DC.

1. Globularia Linn.

1. G. svecica Nym. [43])

ORD. 53. CAMPANULACEÆ JUSS.

1. Jasione Linn.

1. J. montana Linn.

»litoralis». [44])

2. Phyteuma Linn.

1. P. spicatum Linn.

3. Campanula Linn.

a. Eucampanula.

α. Trachelioideæ:

1. C. Cervicaria Linn.

2. C. glomerata Linn.

3. C. Trachelium Linn.

(3.) C. urticæfolia Schmidt.

4. C. latifolia Linn.

5. C. rapunculoides Linn.

† 6. C. bononiensis Linn.

β. Lævigatæ:

7. C. persicifolia Linn.

8. C. Rapunculus Linn.

9. C. patula Linn.

10. C. rotundifolia Linn.

11. C. uniflora Linn.

b. Medium Alph. DC.

12. C. barbata Linn.

ORD. 54. GENTIANACEÆ LINDL.

A. *GENTIANEÆ Griseb.*

1. Gentiana Linn.

α. Coelanthæ:

1. G. purpurea Linn. [45])

---

pratensis Moench. — [33]) Spic. longiores, *cylindraceæ.* — [34]) Plant. eriophora Brot. P. lanuginosa DC.; in Linn. svec. ed. II. pag. 46 proposita absque nomine specifico. — [35]) (G. F. W. Mey.); fol. in petiolum elongatum attenuata, *subsemipedalia, 2—3 poll. lata.* — [36]) *Annua, segetalis.* — [37]) Plant. major var. angustissima Wg. P. minor Fr. — [38]) Armeria vulgaris Willd. — [39]) Armeria Rupr. — [40]) Armeria Willd. — [41]) (*Herbar.*) Stat. bahusiensis Fr. S. rariflora Drej. — [42]) Stat. Behen Drej. — [43]) (*Syllog. pag. 140 in not.*) Glob. vulgaris Linn. pr. p:te, non *Auct. exter.* G. oelandica Beurl. in herbar. propr.; forte *insul. balticis priva.* — [44]) Fr. herbar. norm. VI. 12. — [45]) Gent. lutea Linn.

β. Pneumonanthæ:

2. G. Pneumonanthe Linn.

γ. Cyclostigmaticæ:

3. G. nivalis Linn.

δ. Crossopetalæ:

4. G. detonsa Rottb. [46]
(4.) G. serrata Gunn. [47]

ε. Gentianastra: [48]

5. G. campestris Linn. [49]
6. G. germanica Willd. [50]
7. G. Amarella Linn. [51]
(7.) G. lingulata Ag. [52]
8. G. tenella Rottb. [53]

ς. Arcticæ:

9. G. involucrata Rottb. [54]
(9.) G. umbellata MB. [55]

2. Erythræa Pers.

(1.) E. pulchella Hornem. [56]
1. E. ramosissima Pers.
2. E. linarifolia Pers.
3. E. Centaurium Pers.

B. *MENYANTHEÆ Mart.*

3. Menyanthes Linn.

1. M. trifoliata Linn.

ORD. 55. LOBELIACEÆ JUSS.

1. Lobelia Linn.

1. L. Dortmanna Linn. [57]

ORD. 56. LENTIBULARIEÆ RICH.

1. Pinguicula Linn.

1. P. vulgaris Linn.
2. P. alpina Linn.
3. P. villosa Linn.

2. Utricularia Linn. [58]

1. U. vulgaris Linn.
2. U. neglecta Lehm.
3. U. intermedia Hayn.
4. U. ochroleuca Rob. Hn.
5. U. Bremii Heer.
6. U. minor Linn.

ORD. 57. PRIMULACEÆ VENT.

A. *HOTTONIEÆ Endl.*

1. Hottonia Linn.

1. H. palustris Linn.

B. *PRIMULEÆ Endl.*

2. Androsace Linn.

1. A. septentrionalis Linn. »exscapa».

3. Primula Linn.

α. Aleuritiæ:

1. P. (sibirica Jacq.)
(1.) P. finmarkica Jacq. [59]
2. P. stricta Hornem.
(3.) P. scotica Hook. [60]
3. P. farinosa Linn.

---

svec. — [46]) (*Act. hafn., 1770.*) Gent. ciliata Gunn., non *Linn.;* potiss. 4-mera. — [47]) (*Norveg.,* 1772); potiss. 5-mera. — [48]) »Endotrichæ»; faux corollæ in his *barbata,* in ceteris nuda. — [49]) Gent. chloræfolia Nees; var. ut G. Amarella Linn. — [50]) Var. ut subsequens (et tunc: Gent. obtusifolia Willd.) — [51]) (*Herbar.*) Fr. herbar. norm. VI. 15 »lancifolia». Gent. axillaris Rchnb. — [52]) Fr. herbar. norm. VI. 14. — [53]) (*Act. hafn., 1770.*) Gent. Koenigii Gunn. (1772.) G. glacialis Vill. (1787.) — [54]) »Flor. albi, exsiccatione parum lutescentes, unde forsan: Gent. aurea Linn.» *Wg.* — [55]) »Florib. bracteisque cærulescentibus» *Wg.* — [56]) (*Fl. dan.*), Fr. Gentiana Sw.; subsequentis »speciminn depauperata» *Koch.* — [57]) *Dortmanna* palustris G. Don. — [58]) An omnes infra admissæ stirpes re vera sint *species definitæ,* nec ne, dijudicare non audeo. — [59]) Prim. integrifolia Gunn., non *Linn.* P. norvegica Retz. — [60]) Prim. farinosa tubulosa Beurl. in herbar. propr.; ex

β. Primulastra:

4. P. veris Linn. [61])
5. P. elatior Jacq. [62])
6. P. acaulis Jacq. [63])

C. *ROTACEÆ Linn.* [64])

4. Lysimachia Linn.

a. Naumburgia Moench.

1. L. thyrsiflora Linn. [65])

b. Eulysimachia.

2. L. vulgaris Linn.

c. Nummularia.

3. L. Nummularia Linn.

d. Lerouxia Merat.

4. L. nemorum Linn. [66])

5. Trientalis Linn.

1. T. europæa Linn.

6. Anagallis Linn.

1. A. arvensis Linn. [67])
(1.) A. cærulea Schreb.

7. Centunculus Linn.

1. C. minimus Linn.

D. *GLAUCINEÆ:*

8. Glaux Linn. [68])

1. G. maritima Linn. [69])

E. *SAMOLEÆ Endl.*

9. Samolus Linn.

1. S. Valerandi Linn.

ORD. 58. BORAGINEÆ JUSS. [70])

1. Mertensia Roth. [71])

1. M. maritima G. Don.

2. Pulmonaria Linn.

1. P. officinalis Linn.
2. P. angustifolia Linn. [72])

3. Lithospermum Linn.

α. Lithospermastra:

1. L. officinale Linn.

β. Rhytisperma:

2. L. arvense Linn.

4. Myosotis Linn.

1. M. palustris Wither. [73])
(1.) M. laxiflora Rchnb. [74])
(1.) M. strigulosa Rchnb.
2. M. lingulata Lehm. [75])
3. M. sylvatica Hoffm.
4. M. intermedia Link. [76])

Duby (*DC. prodr.*) ne ut varietas quidem a subsequente separanda. — [61]) Prim. officinalis Jacq. — [62]) Prim. veris *β*. Linn. — [63]) Prim. veris *γ*. Linn. P. grandiflora Lam. — [64]) *Lysimachieæ* et *Anagallideæ* Auct. — [65]) Naumburgia guttata Moench. N. thyrsiflora Rchnb. — [66]) Lerouxia Merat. — [67]) Anag. phoenicea Lam. — [68]) »Genus multo affinius *Paronychieis* quam *Primulaceis*» *Koch;* corolla deficit! — [69]) *Polygoni* quasdam species maritimas (ex *Avicularis*) habitu contingens. — [70]) Asperifoliæ Linn. *Nb. Boragineæ* plures, ex. gr. *Mertensiæ* species nonnullæ, fol. *lævissimis* gaudent. — [71]) (*1797.*) Hippoglossum Hartm. (1820.) Stenhammera (pro: Stenhammaria) Rchnb. (1830.) — [72]) (*Svec.* et *herbar.:* specim. e *Skara* Vestrog.) — [73]) *α.*; caul. *patentim* pilosus. — [74]) Caul. *adpresse* — ram. *patentim* pilosi. — [75]) (*1818.*) Myosot. maritima Fr. (*1817; nom. sæpe non quadrans.*) M. cæspitosa K. F. Schultz (1819.) — [76]) »Nomen Myosot. arvensis, toties et ab *Ehrharto* ipso ab una ad alteram speciem translatum, confusionem

5. M. hispida Schlecht. [77])
6. M. stricta Link.
7. M. versicolor Link. [78])

5. Echinospermum Sw. [79])

α. Echinospermastra:

1. E. Lappula Lehm.

β. Homalocarya:

2. E. deflexum Lehm.

6. Asperugo Linn.

1. A. procumbens Linn.

7. Cynoglossum Linn.

1. C. officinale Linn.

8. Echium Linn.

1. E. vulgare Linn.

9. Symphytum Linn.

1. S. officinale Auct. [80])
2. S. uplandicum Nym. [81])

10. Anchusa Linn.

1. A. officinalis Linn.

11. Lycopsis Linn.

1. L. arvensis Linn.

ORD. 59. POLEMONIACEÆ VENT.

1. Polemonium Linn.

1. P. cæruleum Linn.

ORD. 60. CONVOLVULACEÆ VENT.

A. *CONVOLVULEÆ Chois.*

1. Convolvulus Linn.

a. Calystegia R. Br.

1. C. sepium Linn. [82])

b. Euconvolvulus.

2. C. arvensis Linn.

B. *CUSCUTEÆ Chois.*

2. Cuscuta Linn. [83])

1. C. Epilinum Weih.
(2.) C. halophyta Fr.
2. C. major DC. [84])
(2.) C. Ligustri F. W. C. Aresch.
3. C. (Epithymum Murr.)
(3.) C. Trifolii Bab.

ORD. 61. ASCLEPIADEÆ R. BR.

1. Cynanchum Linn.

1. C. Vincetoxicum R. Br. [85])

ORD. 62. SOLANACEÆ BARTL.

A. *SOLANEÆ Dun.*

1. Lycium Linn.

†1. L. barbarum Linn.

2. Solanum Linn.

α. Dulcamaræ:

1. S. Dulcamara Linn. [86])

β. Morellæ:

2. S. nigrum Linn. [87])

---

jam ortam semper angebit» *Koch.* — [77]) Myosot. scorpioides Linn. herbar. — [78]) (*Schlecht.*) Myosot. scorpioides *collina* Ehrh. — [79]) (*Lehm.*) Lappula Moench (non *Pluk. alm.:* Triumfetta Lappula.) — [80]) Linn. pr. p:te. Symphyt. bohemicum Schmidt. S, patens Sibth. — [81]) Symphyt. officinale Linn. herbar. S. patens Fr. mant. II, non *Sibth.* S. orientale Fr. summ., non *Linn.:* stirps longe diversa, habitans circa *Bosporum,* unde specim. misit *Cel. Hedenborg.* — [82]) Calystegia R. Br. — [83]) Conf. F. W. C. Aresch. revis. Cusc. svec. — [84]) Cusc. europæa Linn. pr. p:te. C. vulgaris Pers.; in Bahusiæ borealis maritimis legi parasiticam in *Galio vero, Achillea Millefolio, Vicia Cracca, Ligustro* et *Trifolio medio.* — [85]) *Vincetoxicum* officinale Moench. — [86]) Dulcamara flexuosa Moench. — [87]) *α:*

3. S. humile Bernh. [88]
4. S. villosum Lam. [89]
5. S. miniatum Bernh. [90]

B. *HYOSCYAMEÆ Endl.*

3. Hyoscyamus Linn.

1. H. niger Linn.

C. *DATUREÆ G. Don.*

4. Datura Linn.

†1. D. Stramonium Linn. [91]

ORD. 63. SCROPHULARINEÆ BARTL. [92]

VERBASCEÆ:

1. Verbascum Linn.

(1.) V. cuspidatum Schrad.
1. V. thapsiforme Schrad. [93]
V. nigro-thapsiforme.
V. thapsiformi-nigrum.
2. V. nigrum Linn.
V. thapso-nigrum.
V. nigro-thapsus.
3. V. Thapsus Linn. [94]
(3.) V. bracteatum Ag. [95]
†4. V. phlomoides Linn.
5. V. (Lychnitis Linn.)
(5.) V. album Mill.

SCROPHULARIEÆ:

2. Scrophularia Linn.

α. Veniliæ:

†1. S. vernalis Linn.

β. Scrophulariastra:

2. S. nodosa Linn.
†3. S. aquatica Auct. [96]

ANTIRRHINEÆ:

3. Digitalis Linn.

1. D. purpurea Linn.

4. Antirrhinum Linn.

1. A. Orontium Linn.

5. Linaria Mill.

α. Linariastra:

1. L. vulgaris Mill.
»Peloria».
†2. L. striata DC.

β. Chænorrhinæ:

3. L. minor Desf.

γ. Elatinariæ:

4. L. Elatine Mill.

SIBTHORPIEÆ:

6. Limosella Linn.

1. L. aquatica Linn.
(1.) L. borealis Less. [97]

VERONICEÆ:

7. Veronica Linn.

α. Cochlidiospermæ:

1. V. hederæfolia Linn.
2. V. persica Poir. [98]
3. V. agrestis Linn. [99]
(3.) V. pulchella Bast. [100]
(3.) V. opaca Fr.

---

melanocarpum; subsequentia ex mente nonnullor. nil nisi modificationes. — [88]) (*Willd. enum.*); *chlorocarpum.* — [89]) *Xanthocarpum.* — [90]) (*Willd. enum.*); *erythrocarpum.* — [91]) Stramonium foetidum Scop. — [92]) Scrophulariaceæ Lindl. pr. p:te. — [93]) Verbasc. Thapsus G. F. W. Mey. — [94]) (*Herbar.*), Schrad. Verbasc. Schraderi G. F. W. Mey. — [95]) Legi ad *Stora Blecktornet* Holmiæ. — [96]) Linn. pr. p:te. Scroph. Ehrharti Stev. — [97]) Limos. aquatica *β.* Wg. lapp. — [98]) Veron. Buxbaumii Ten.; per orbem fere totum dispersa, quare V. *persicæ* nomen a nonnullis postponitur. — [99]) (*Herbar.*) Veron. polita Fr. *Nb.* Benth. (*DC. prodr.*) hanc et subsequentes ne quidem ut varietates distinguit. — [100]) (*1809.*) Veron. versicolor

β. Veronicastra:

* Annuæ:

4. V. arvensis Linn.
5. V. verna Linn.
6. V. triphyllos Linn.

†7. V. peregrina Linn. [1]

** Perennes:

8. V. serpyllifolia Linn.
   »borealis». [2]
9. V. alpina Linn.
   »australis». [3]
10. V. fruticulosa Linn. [4]

γ. Pleurobotryæ:

11. V. officinalis Linn.
12. V. Chamædrys Linn.
13. V. montana Linn.
14. V. scutellata Linn.

(14.) V. parmularia Poit. et Turp. [5]

15. V. Anagallis Linn.
16. V. Beccabunga Linn.

δ. Acrostachyæ:

17. V. spicata Linn.

(17.) V. hybrida Auct. [6]

(17.) V. spuria Linn. [7]

(18.) V. maritima Linn.

18. V. longifolia Linn.

ORD. 64. VERBENACEÆ JUSS.

1. Verbena Linn.

1. V. officinalis Linn.

ORD. 65. LABIATÆ JUSS.

MONARDEÆ:

1. Salvia Linn.

1. S. pratensis Linn.

MENTHEÆ:

2. Elsholtzia Willd.

†1. E. cristata Willd.

3. Mentha Linn. [8]

†(1.) M. viridis Linn. [9]

1. M. sylvestris Linn. [10]

(1.) M. nemorosa Willd. [11]

†2. M. nepetoides Lej. [12]

3. M. aquatica Linn. [13]
   »glabrata». [14]
   »verticillata». [15]

(4.) M. lapponica Wg.

4. M. arvensis Linn.
   »riparia». [16]

Fr. nov. ed. I. V. agrestis cj. summ.; *var.* (cum V. agresti omni) lob. calycinis *subincisis.* — 1) Habeo specim. a *C. Arosenio* Ostrogothiæ lecta 1816. — 2) (Læst.); coroll. tota cærulea *estriata.* — 3) (Wg.); capsul. *setulosæ.* *Nb.* Hanc mittunt ex alpib. Europ. australioris! — 4) *α.* cærulea: Veron. saxatilis Jacq. (*β.* carnea, quæ: V. fruticulosa Linn.!, in *Scand.* deest.) »V. fruticulosa Linn. florib. carneis et V. saxatilis Jacq. florib. cæruleis, aliis characteribus nequaquam, distinguendæ» *Benth.* — 5) Veron. scutellata pubescens Auct. — 6) (Non *Linn. herbar.:* specim. deforme, »facie Veronicæ officinalis», in insul. lacus *Mæleri Fläsklösan* Holmiæ ab *ipso* olim, nec ullo alio, lectum.) Veron. spicata latifolia Koch. *Nb.* Peculiariter in insula illa minima etiam observata est *Peloria Linariæ vulgaris.* — 7) (*Herbar.*), Rchnb. (non Kochii: Veron. paniculata Linn., Benth.); fol. subalterna (V. alternifolia Lej.) vel opposita vel subterna. Legi in *Råholmen* (Bockholmen) extra *Ålkistan* Holmiæ. — 8) *Menthæ* pleræque sunt *subpolygamo-dioicæ,* nempe: *submasculæ* (florib. majoribus et staminib. exsertis) atque *subfemineæ* (florib. minoribus et staminib. inclusis). — 9) Menth. sylvestris glabra Koch. — 10) (*Herbar.*) Fr. herbar. norm. IX. 11. — 11) Fr. herbar. norm. I. 18; *latifolia.* — 12) Dicitur *hybrida* e præcedente et subsequente. — 13) Fr. herbar. norm. II. 25 (in Europ. *australiore* hirsutior, capitul. vix interruptis). — 14) Fr. herbar. norm. IV. 16. — 15) Menth. aquatica Linn. herbar.; stirps verticill. *compluribus distantibus*, ab Auctorib. multum vexata! — 16) Fr. herbar. norm. II. 27; *subvio-*

(5.) M. hirsuta Linn. [17])
5. M. sativa Linn. [18])
6. M. gentilis Linn. [19])
†(6.) M. rubra Huds. [20])

4. Lycopus Linn.

1. L. europæus Linn.

SATUREJEÆ:

5. Origanum Linn.

1. O. vulgare Linn.

6. Thymus Linn.

1. T. Serpyllum Linn.
(1.) T. Chamædrys Fr. [21])

7. Calamintha Moench.

1. C. Acinos Clairv. [22])

8. Clinopodium Linn.

1. C. vulgare Linn.

NEPETEÆ:

9. Nepeta Linn.

1. N. Cataria Linn. [23])

10. Glechoma Linn.

1. G. hederacea Linn. [24])

11. Dracocephalum Linn.

a. Eudracocephalum.

†1. D. thymiflorum Linn.

b. Ruyschiana Mill.

2. D. Ruyschiana Linn. [25])

SCUTELLARIEÆ:

12. Scutellaria Linn.

1. S. hastifolia Linn.
2. S. galericulata Linn.

13. Prunella Linn.

(1.) P. parviflora Lam.
1. P. vulgaris Linn.
2. P. grandiflora Jacq. [26])

STACHYDEÆ:

14. Betonica Linn.

1. B. (officinalis Linn.)
(1.) B. stricta Ait.

15. Stachys Linn.

* Perennes:

1. S. sylvatica Linn.
S. palustri-sylvatica.
S. sylvatica-palustris.
2. S. palustris Linn.

** Annuæ:

3. S. arvensis Linn.

16. Galeopsis Linn. [27])

(1.) G. angustifolia Ehrh.
1. G. Ladanum Linn.
2. G. pubescens Bess.
3. G. Tetrahit Linn.
(3.) G. bifida Boenningh. [28])
(3.) G. versicolor Curt. [29])

17. Lamium Linn.

a. Galeobdolon Huds.

1. L. Galeobdolon Crantz. [30])

---

lascens, glabrata. — [17]) (*Herbar.:* specim. *Osbeckian.* ex *Halland.*) Menth. sativa hirsuta Koch. M. aquatica villosa Hartm. — [18]) *Auct.* Menth. Agardhiana Fr. nov. ed. I., Hartm. — [19]) (*Herbar.*) Fr. herbar. norm. VI. 13. »Ad sexum grandiflorum pertinet Menth. Agardhiana Fr. mant. III». *Koch.* — [20]) Fr. Menth. gentilis gracilis Koch. — [21]) Thym. Serpyllum *β.* Benth. (*DC. prodr.*) T. Serpyllum *α.* Koch. — [22]) *Acinos* vulgaris Pers. — [23]) *Cataria* vulgaris Moench. — [24]) In *umbroso-uliginosis* gaudet florib. majoribus (*α.* Benth.); vide sub *Mentha.* — [25]) Ruyschiana spicata Mill. — [26]) Prunell. vulgaris *β.* Linn. — [27]) *Galeopsides* gaudent florib. majoribus et minoribus; vide sub *Mentha.* — [28]) Huc: Fr. herbar. norm. VII. 8. — [29]) Galeops. Tetrahit grandiflora Benth. (*DC. prodr.*) — [30]) Ga-

b. **Eulamium.**

* Perennia:

2. L. album Linn.
†3. L. lævigatum Linn. [31]

** Annua:

4. L. purpureum Linn.
»decipiens». [32]
L. amplexicauli-purpureum. [33]
L. purpureo-amplexicaule. [34]
5. L. amplexicaule Linn.

18. Ballota Linn.

1. B. nigra Linn. [35]
(1.) B. alba Linn. [36]

19. Marrubium Linn.

1. M. vulgare Linn.

20. Leonurus Linn.

1. L. Cardiaca Linn.

AJUGEÆ:

21. Teucrium Linn.

α. Scorodoniæ:

1. T. Scorodonia Linn.

β. Scordia:

2. T. Scordium Linn.

22. Ajuga Linn.

1. A. reptans Linn. [37]
2. A. genevensis Linn. [38]
3. A. pyramidalis Linn. [39]

ORD. 66. RHINANTHACEÆ KOCH. [40]

1. Melampyrum Linn.

1. M. cristatum Linn.
2. M. arvense Linn.
3. M. nemorosum Linn.
4. M. pratense Linn.
5. M. sylvaticum Linn.

2. Rhinanthus Linn. [41]

1. R. major Ehrh.
»apterus». [42]
2. R. angustifolius C.C.Gmel. [43]
3. R. minor Ehrh.

3. Euphrasia Linn.

a. **Euphrasiætypus.** [44]

1. E. pratensis Rchnb.
»alpestris». [45]
2. E. nemorosa Rchnb.
»curta».
3. E. gracilis Fr. [46]
4. E. salisburgensis Funk. [47]

b. **Odontites Pers.**

5. E. Odontites Linn. [48]
»litoralis». [49]

---

leobdolon luteum Huds. — [31]) *Nb.* Lam. maculatum Linn. non nisi foliis *macula albida* longitudinaliter notatis differt. — [32]) (Koch.) — [33]) Lam. incisum Willd. L. confertum Fr., herbar. norm. X. 16. — [34]) Lam. intermedium Fr., herbar. norm. I. 15. — [35]) (*Herbar.:* specim. dentib. calycinis *angustioribus.*) Ball. vulgaris Hffms. et Link. — [36]) (*Herbar.:* specim. dentib. calycinis *latioribus.*) — [37]) Huc: Ajug. alpina Fr. summ. (non ej. nov.: A. genevensis Linn.) — [38]) Ajug. genevensis et A. alpina Linn. herbar. Fr. herbar. norm. I. 16. — [39]) Huc: Ajug. alpina Thom. et forte Gunn. — [40]) Scrophulariaceæ Lindl. pr. p:te. — [41]) Rhin. *Crista galli* Linn.! — [42]) Fr. herbar. norm. X. 19; *segetalis.* — [43]) Specim. brachiata pede longiora in subsylvaticis alpis *Mullfjellet* Jemtl. legi. — [44]) Euphr. *officinalis* Linn.! — [45]) »Euphr. micrantha Rchnb.» *Læst. in sched.* — [46]) In *ericetis* (circa *Strömstad* Bahus. frequ.) — [47]) (*Hopp.*) Euphr. officinalis salisburgensis Benth. (*DC. prodr.*) — [48]) *α.* Odontites verna Rchnb. (*β.* Linn., quæ: O. serotina Rchnb., a Benth. ne ut varietas quidem distinguitur.) — [49]) Odontites

4. Bartsia Linn.

1. B. alpina Linn.

5. Pedicularis Linn.

a. **Eupedicularis.**

α. *Faucidentes:*

1. P. palustris Linn.

β. *Bicuspidatæ:*

2. P. sylvatica Linn.

γ. *Edentulæ:*

3. P. lapponica Linn.
4. P. hirsuta Linn.
5. P. flammea Linn.
6. P. Oederi Vahl.

(6.) P. virescens Wg. [50]

b. **Sceptrum (Rudb.) Hn.**

7. P. Sceptrum Carolinum Linn. [51]

ORD. 67. OROBANCHEÆ JUSS.

1. Orobanche Linn.

1. O. elatior Sutt. [52]
2. O. Cirsii Fr. [53]
3. O. Epithymum DC.

2. Lathræa Linn.

1. L. Squamaria Linn. [54]

ORD. 68. MONOTROPEÆ NUTT.

1. Monotropa Linn.

1. M. Hypopitys Linn. [55]

(1.) M. hypophegea Wallr. [56]

ORD. 69. PYROLACEÆ LINDL.

1. Pyrola Linn.

a. **Eupyrola.**

α. *Chlorotropæ:*

1. P. secunda Linn.

β. *Pyrolastra:*

2. P. chlorantha Sw.
3. P. rotundifolia Linn.
4. P. media Sw.
5. P. minor Linn.

b. **Moneses Salisb.**

6. P. uniflora Linn. [57]

c. **Chimaphila Pursh.**

7. P. umbellata Linn. [58]

ORD. 70. VACCINIEÆ DC.

1. Vaccinium Linn.

a. **Myrtillus Gilib.**

1. V. Myrtillus Linn. [59]
2. V. uliginosum Linn. [60]

b. **Euvaccinium.**

3. V. Vitis idæa Linn.

c. **Oxycoccus Pers.** [61]

4. V. Oxycoccus Linn. [62]

ORD. 71. DIAPENSIACEÆ LINDL. [63]

1. Diapensia Linn.

1. D. lapponica Linn.

---

rubra simplex Hartm. — [50]) Pedic. foliosa Gunn., non *Linn.;* nil nisi præcedentis specim. *luxuriosa* (qualia e *Jemtl. boreali-occidentali* ipse reportavi.) — [51]) Sceptrum Carolinum (*Rudb.*) Hartm. — [52]) Orobanch. major Linn. svec. quoad loc. nat.: »Scan. ad Rå», non *ej. herbar.:* O. minor Sutt., ex C. Hartm. — [53]) *Nb. Cirsiis* privæ sunt *Orobanches* plures, ex. gr. O. procera Koch et O. pallidiflora Wimm. et Grab. — [54]) Squamaria Orobanche Scop. — [55]) Monotr. Hypopitys β. hirsuta Roth. — [56]) Monotr. Hypopitys α. glabra Roth. — [57]) Moneses grandiflora Salisb. — [58]) Chimaphila Nutt. — [59]) Myrtillus nigra Gilib. — [60]) Myrtillus uliginosa Drej. — [61]) (*Tournef.*) Schollera Roth. — [62]) Oxycoccus palustris Pers — [63]) *Polemoniaceis* a nonnullis subjunctæ sed a Benth. (*DC. prodr. IX.*)

ORD. 72. ERICACEÆ LINDL.

1. Ledum Linn.

1. L. palustre Linn.

2. Rhododendrum Linn.

1. R. lapponicum Wg.

3. Azalea Linn.

1. A. procumbens Linn. [64])

4. Arbutus Linn.

1. A. Uva ursi Linn. [65])
2. A. alpina Linn. [65])

5. Andromeda Linn.

a. Chamædaphne Moench. [66])

1. A. calyculata Linn. [67])

b. Euandromeda.

2. A. polifolia Linn.

c. Cassiope Don.

α. Laterifloræ:

3. A. tetragona Linn. [68])

β. Apicifloræ:

4. A. hypnoides Linn. [68])

6. Menziesia Sm.

1. M. cærulea Sw. [69])

7. Erica Linn.

a. Euerica. [70])

1. E. Tetralix Linn.
2. E. cinerea Linn.

b. Calluna Salisb.

3. E. vulgaris Linn. [71])

ORD. 73. TAMARISCINEÆ DESV.

1. Tamarix Linn.

1. T. germanica Linn. [72])

ORD. 74. EMPETREÆ NUTT.

1. Empetrum Linn.

1. E. nigrum Linn.

ORD. 75. EUPHORBIACEÆ JUSS.

1. Mercurialis Linn.

1. M. perennis Linn.
†2. M. annua Linn.

2. Euphorbia Linn.

* Annuæ:

1. E. Helioscopia Linn.
2. E. Peplus Linn.
3. E. exigua Linn.

** Perennes:

4. E. Cyparissias Linn.
5. E. Esula Linn.
6. E. palustris Linn.

ORD. 76. ELÆAGNEÆ R. BR.

1. Hippophaë Linn.

1. H. rhamnoides Linn.

ORD. 77. THYMELEÆ JUSS.

1. Daphne Linn.

1. D. Mezereum Linn.

---

exclusæ; »*Ericaceis* magis affines» *Chois. l. c. pag. 324 in not.* — [64]) *Loiseleuria* Desv. — [65]) *Arctostaphylos* Spreng. — [66]) (*1794.*) Cassandra Don (1814.) — [67]) Chamædaphne Moench. — [68]) Cassiope Don. — [69]) *Phyllodoce* taxifolia Salisb. — [70]) *Nostræ:* Eremocallides. — [71]) Calluna Salisb. — [72]) *Myricaria* Desv.

ORD. 78. SANTALACEÆ R. BR.

1. Thesium Linn.

1. T. alpinum Linn. [73])

ORD. 79. PARONYCHIEÆ ST. HIL.

A. *SCLERANTHEÆ Link.*

1. Scleranthus Linn.

1. S. annuus Linn.
2. S. perennis Linn.

B. *ILLECEBREÆ DC.*

2. Herniaria Linn.

1. H. glabra Linn.

ORD. 80. POLYGONACEÆ LINDL.

1. Koenigia Linn.

1. K. islandica Linn.

2. Polygonum Linn.

a. Eupolygonum.

α. Aviculariæ:

1. P. aviculare Linn. »erectum».

β. Bistortæ:

2. P. viviparum Linn.
3. P. Bistorta Linn.

γ. Polygonastra:

4. P. amphibium Linn. »terrestre». [74])

(5.) P. nodosum Pers.
5. P. lapathifolium Auct. [75])
(5.) P. pallidum With.
(5.) P. incanum Schmidt.
6. P. Persicaria Linn. [76])
7. P. mite Schrank.
8. P. minus Huds.
9. P. Hydropiper Linn.

δ Helxines:

10. P. dumetorum Linn.
11. P. Convolvulus Linn.

b. Fagopyrum Gærtn.

†12. P. Fagopyrum Linn. [77])
†13. P. tataricum Linn. [78])

3. Oxyria Hill.

1. O. reniformis Campd.

4. Rumex Linn.

a. Acetosa Mill.

1. R. Acetosella Linn. [79])
2. R. Acetosa Linn. [80]) »alpestris».
†3. R. scutatus Linn. [81])

b. Eurumex.

* Perennes:

4. R. Hydrolapathum Huds.
5. R. maximus Schreb.
6. R. aquaticus Linn. [82])
†7. R. Patientia Linn.
8. R. longifolius DC. [83])
9. R. crispus Linn.
10. R. conspersus Hn.
11. R. pratensis Mert. et Koch. [84])
12. R. obtusifolius Linn. [85])

— [73]) (*Spec. et herbar.*) Thes. linophyllum Linn. svec. — [74]) Polygon. amphibium *α.* Linn. svec. — [75]) *Ait.*, non *Linn. herbar.*, ubi nostrum desideratur. Polygon. Persicaria Wg. — [76]) (*Herbar.* et, Polygon. lapathifolio incl., *ej. svec.*) P. biforme Wg. — [77]) Fagopyrum esculentum Moench. — [78]) Fagopyrum Gærtn. — [79]) Acetosa Mill. — [80]) Acetosa pratensis Mill. — [81]) Acetosa scutata Mill. — [82]) (*Spec., svec.* et *herbar.*) Rum. Hippolapathum Fr. R. Friesii Aresch. — [83]) (*Gall.*): Rum. domesticus Hartm., teste Meisn. (*DC. prodr. XIV. pag. 44.*) — [84]) Rum. cristatus Wallr., non *DC.*; in Linn. herbar. haud reperiendus. — [85]) (*Spec.*), Wallr. (»Rum. divaricatus. L.!» *Fr.*) R. Friesii Gren. et Godr.; in

(12.) R. sylvestris Wallr. [86])
13. R. conglomeratus Murr. [87])
(14.) R. viridis Sibth. [88])
†14. R. sanguineus Linn. [89])

* * Subbiennes:

(15.) R. palustris Sm. [90])
15. R. maritimus Linn.

ORD. 81. SALSOLACEÆ MOQ.

1. Atriplex Linn.

a. Euatriplex.

†1. A. hortensis Linn.
†2. A. nitens Rebent.
3. A. alba Scop. [91])
4. A. hastata Linn. [92])
5. A. patula Linn. [93])
»crassifolia». [94])
»depressa». [95])
6. A. angustifolia Sm. [96])
7. A. litoralis Linn.
(7.) A. marina Linn.

b. Obione Gærtn. [97])

†8. A. portulacoides Linn. [98])
9. A. pedunculata Linn. [98])

2. Salicornia Linn.

(1.) S. prostrata Osb.
1. S. herbacea Linn.
»pachystachya».

3. Salsola Linn.

1. S. Kali Linn.

4. Kochia Roth.

1. K. hirsuta Nolt. [99])

5. Suæda Forsk.

1. S. maritima Dum. [100])

6. Beta Linn.

†1. B. maritima Linn.

7. Blitum Linn.

a. Agathophytum Moq.

1. B. Bonus Henricus C. A. Mey. [1])

b. Eublitum.

α. Blitastra: [2])

†(2.) B. capitatum Linn. [3])
†2. B. virgatum Linn. [4])

Scand. multo rarior subsequente. — [86]) Rum. obtusifolius Fr.; fere ubique juxta pagos et domos »in humidiusculis» *Linn. svec.* (sub R. acuto.) — [87]) Rum. acutus Linn. herbar., Sm., DC. etc. R. glomeratus Schreb. *Nb.* R. Nemolapathum Ehrh. a nonnullis (ex *ej. phytophylac. n:ro. 94*) ad speciem hanc, ab aliis (ex *specim. Ehrhartian. in herbar. Sm.*) ad subsequentem citatur, ambas colligens sec. Doell rhen. — [88]) Rum. sanguineus *β.* viridis Sm. (*α.* Koch.) R. nemorosus Schrad.; de R. Nemolapatho Ehrh. vide sub R. conglomerato. — [89]) (*Spec.*, ubi locus: »Virginia».) — [90]) Rum. maritimus *β.* Huds. — [91]) (*1760.*) Atripl. rosea (1763), »pro: rosulata, ob glomerulos fructiferos rosulatos» *Rchnb.;* in Linn. herbar. frustra quæsita! — [92]) (*Herbar.*), Sm., Rchnb., Koch, Hartm. (*nb.:* in ej. scand. ed. VI. et VII. contextus hinc inde emendatus!) Atripl. hastata calotheca Schum. sællund.; stirps »valvul. femineis *magnis*» *Linn.*, obvia »in Europ. *frigidiori*» *id.* — [93]) (*Herbar.* et, specie subsequente incl., ej *spec.* atque *svec.*). Sm. etc. Atripl. latifolia Wg. (»A. hastata. L.! clare!» *Fr.*); modificationes plures, *insigniores* infra. — [94]) Atripl. crassifolia Fr., *C. A. Mey.?;* legi in insul. *norvegicis Hvalöarne* maris baltici occidentalis. — [95]) (Hartm.); in litorali imprim. *baltico-occidentali.* — [96]) Desideratur in Linn. herbar. — [97]) Halimus Wallr., at *Halimus genuinus* (Atripl. Halimus Linn.) inter *Euatriplices* militat! — [98]) Obione Moq. — [99]) *Echinopsilon* hirsutus Moq. — [100]) *Chenopodina* Moq. — [1]) Agathophytum Moq. Chenopodium Linn. — [2]) *Morocarpa.* — [3]) Blit. virgatum *β.* Coss. et Germ. — [4]) »Eadem planta non raro profert fructus baccatos et herbaceos (Blit. chenopo-

β. *Amorocarpa:*

* Erecta:

3. B. rubrum Rchnb. [5])

** Decumbentia:

4. B. glaucum Rchnb. [5])

8. Chenopodium Linn.

α. *Vulvariæ:*

1. C. Vulvaria Linn.

β. *Chenopodiastra:*

2. C. murale Linn.
(3.) C. viride Linn. [6])
3. C. album Linn. [7])
4. C. opulifolium Schrad. [8])
5. C. urbicum Linn.
6. C. hybridum Linn.

γ. *Lipandræ:*

7. C. polyspermum Linn. [9])
(7.) C. acutifolium Kit. [10])

ORD. 82. AMARANTHACEÆ R. BR.

1. Amaranthus Linn.

1. A. viridis Linn. [11])

ORD. 83. URTICACEÆ LINDL.

URTICEÆ:

1. Parietaria Linn.

1. P. erecta Mert. et Koch. [12])

2. Urtica Linn.

α. *Monoicæ:*

1. U. urens Linn.

β. *Dioicæ:*

2. U. dioica Linn.

CANNABINEÆ:

3. Humulus Linn.

1. H. Lupulus Linn.

ORD. 84. ULMACEÆ AG.

1. Ulmus Linn.

1. U. campestris Linn. [13])
»suberosa».
(1.) U. glabra Mill. [14])
»suberosa».
2. U. pedunculata Foug. [15])

ORD. 85. CUPULIFERÆ RICH.

1. Quercus Linn.

1. Q. Robur Linn. [16])
{(1.) Q. intermedia Don.
{(1.) Q. sessiliflora Salisb.

2. Fagus Linn.

1. F. sylvatica Linn.

3. Carpinus Linn.

1. C. Betulus Linn.

---

dioides Linn. mant.) ex eodem ramo» *Rchnb.* — [5]) Chenopodium Linn. — [6]) »In cult. oleraceis; inter omnes plantas vulgatissimum» *Linn.* — [7]) »In agris» *Linn.* — [8]) *(Koch et Ziz.)* — [9]) »Caul. decumbente, cym. dichotomis» *Linn.* — [10]) *(Schult.)*; »arrectum», »spicato-racemosum». — [11]) *(Spec.)*, Poll. *Euxolus* Moq. Amaranth. Blitum Linn. svec., non *ej. herbar.*: A. sylvestris Desf. ex Planch. et Moq. (*DC. prodr. XIII. pag. 263.*) — [12]) Pariet. officinalis Linn. pr. p:te. — [13]) (*Spec., svec.* et *herbar.*: specim. foliis *scabris!* ex C. Hartm.) Sv. bot. tab. 13. (Ulm. montana Fr.); »juxta domos, pagos et in pratis» *Linn.* — [14]) Fr. herbar. norm. VIII. 57. Ulm. tetrandra! Schkuhr. (U. campestris Fr., at U. campestris ex *Linné ipso* pentandra! est); in *insul. balt.* — [15]) (*1784.*) Ulm. effusa Willd. (1787.) U. octandra Schkuhr. — [16]) Querc. pedunculata Ehrh. —

4. Corylus Linn.

1. C. Avellana Linn.

ORD. 86. SALICINEÆ RICH.

1. Populus Linn.

α. Tremulæ:

†1. P. alba Linn. [17])
†(1.) P. canescens Sm.
(2.) P. villosa Lang.
2. P. tremula Linn.

β. Phyllodeltæ:

†3. P. nigra Auct.
†4. P. pyramidalis Roz. [18])
†5. P. monilifera Ait.

γ. Erobalsama:

†6. P. balsamifera Linn.

2. Salix Linn. [19])

1. S. alba Linn.
2. S. fragilis Linn.
3. S. pentandra Linn.
4. S. amygdalina Linn.
5. S. hastata Linn.
6. S. punctata Wg.
7. S. nigricans Sm.
8. S. phylicifolia Linn. [20])
9. S. depressa Auct. [21])
10. S. myrtilloides Linn.
11. S. repens Linn.
12. S. rosmarinifolia Linn.
13. S. aurita Linn.
14. S. cinerea Linn.
15. S. caprea Linn.
16. S. Lapponum Auct. [22])
17. S. daphnoides Vill.
18. S. lanata Linn.
19. S. glauca Auct. [23])
20. S. Myrsinites Linn.
21. S. arbuscula Auct. [24])
22. S. (pyrenaica Gou.) [25])
»norvegica».
23. S. (retusa Linn.)
»sarmentacea».
24. S. polaris Wg.
25. S. herbacea Linn.
26. S. reticulata Linn.

ORD. 87. BETULINEÆ RICH.

1. Betula Linn.

1. B. alba Linn. [26])
»pendula».
»lobata».
»laciniata.»
(1.) B. pubescens Ehrh. [27])
»glutinosa». [28])
B. nana-glutinosa.
B. glutinosa-nana.

---

[17]) (Subsequente incl.) Popul. nivea Willd. — [18]) Popul. nigra Linn. herbar., ex C. Hartm. P. dilatata Ait. — [19]) Genus (*Hieracii* instar) onustum formis hybridis speciebusque fictis, quas, quum tributum ferre nolui confusioni, in totum omisi, species tantum genuinas easque vere indigenas proponens. — [20]) (*Herbar.*), Sm. Sal. arbuscula Wg. — [21]) Linn. pr. p:te. Sal. vagans Anderss. in bot. 1858 pag. 45. — [22]) Sal. limosa Wg.; »nomen S. Lapponum anteposui, sperans fore, ut in posterum non iterum mutetur, quod facile fieri poterit, quum, sec. beat. *Smith*, S. Lapponum herbarii Linnæani cum S. sericea Vill. eadem sit, et S. glauca herbarii Linnæani ad S. limosam Wg. pertineat» *Koch*. — [23]) Sal. sericea Vill. — [24]) Linn. pr. p:te. Fr. herbar. norm. V. 61. — [25]) Sal. alpicola Anderss. in bot. not. 1858 pag. 47. — [26]) *Auct.* Betul. verrucosa Ehrh.; de modificationib. vide porro Læst. in bot. not. 1856 pag. 103—111. — [27]) Loco depresso umbroso inter *cisternas cygnorum* prope *Drottningholm* in arbores admodum *proceras* excrevit. — [28]) Betula Wallr. B. alba Linn. herbar. B. pubescens glabrata Wg.

2. B. nana Linn.
3. B. fruticosa Pall. [29])

2. Alnus Gærtn.

1. A. glutinosa Gærtn.
»laciniata».
(2.) A. barbata C. A. Mey. [30])
2. A. incana Willd.
»pinnatifida».

ORD. 88. MYRICEÆ RICH.

1. Myrica Linn.

1. M. Gale Linn.

ORD. 89. CONIFERÆ JUSS.

1. Pinus Linn.

a. Eupinus.

1. P. sylvestris Linn.

b. Abies DC.

2. P. Abies Linn. [31])
»viminalis».
3. P. orientalis Linn. [32])

c. Larix DC.

†4. P. Larix Linn. [33])

2. Juniperus Linn.

1. J. communis Linn.
(1.) J. nana Willd.

3. Taxus Linn.

1. T. baccata Linn.

---

carpath.; *»odorata»!* — [29]) Betul. humilis Schrank. — [30]) *(1831.)* Aln. pubescens Tausch (1834.) — [31]) Abies excelsa Poir. — [32]) Abies Poir. — [33]) Larix europæa DC.

PLANTARUM

VASCULARIUM SEU COTYLEDONEARUM

CLASSIS SECUNDA,

NEMPE:

ENDOGENEÆ SEU MONOCOTYLEDONEÆ.

ORD. 90. ORCHIDEÆ LINN.

1. Platanthera Rich.

1. P. chlorantha Cust. [1])
2. P. bifolia Rich.
3. P. obtusata Lindl. [2])

2. Orchis Linn.

a. **Euorchis.**

α. Orchidastra:

1. O. sambucina Linn. »purpurea».
(2.) O. majalis Rchnb. [3])
(2.) O. cruenta Müll.
(2.) O. lapponica Læst. [4])
2. O. latifolia Linn. [5]).
3. O. maculata Linn.
4. O. Traunsteineri Saut.
5. O. (laxiflora Lam.)
(5.) O. palustris Jacq. [6])
6. O. mascula Linn.
7. O. Morio Linn.

β. Herorchides:

8. O. militaris Linn.
9. O. ustulata Linn.

b. **Nigritella Rich.**

10. O. nigra Sw. [7])

c. **Anacamptis Rich.**

11. O. pyramidalis Linn. [8])

3. Gymnadenia R. Br. [9])

a. **Eugymnadenia.**

1. G. conopsea R. Br. »densiflora».
2. G. odoratissima Rich.

b. **Leucorchis E. Mey.**

3. G. albida Rich. [10])

c. **Coeloglossum Hn.** [11])

4. G. viridis Rich. [12])

4. Chamorchis Rich.

1. C. alpina Rich.

5. Herminium R. Br. [13])

1. H. Monorchis R. Br.

6. Goodyera R. Br. [13])

1. G. repens R. Br.

7. Cephalanthera Rich.

1. C. ensifolia Rich.
2. C. rubra Rich.

8. Epipactis Rich.

1. E. latifolia All.
2. E. atrorubens Schult.
3. E. palustris Crantz.

9. Ophrys Linn.

1. O. muscifera Huds. [14])

---

[1]) (*Rchnb. in Moesl. enchir.*) — [2]) *Finnmark.* — [3]) Orch. latifolia Koch. — [4]) (*Rchnb. icon.*) — [5]) Orch. latifolia et O. incarnata Linn. herbar., ex C. Hartm. O. angustifolia Wimm. et Grab. (Fr. herbar. norm. VII. 65, 66, 67.) — [6]) *Gottl.!* — [7]) Nigritella angustifolia Rich. — [8]) Anacamptis Rich. — [9]) (*Ait.*) — [10]) Leucorchis E. Mey. Coeloglossum albidum Hartm. — [11]) (*1820.*) Peristylus Blume (1825.) — [12]) Coeloglossum viride Hartm. — [13]) (*Ait.*) — [14]) Ophr. insectifera

10. Corallorhiza R. Br. [15])

1. C. innata R. Br.

11. Malaxis Sw.

a. Eumalaxis.

1. M. paludosa Sw.

b. Microstylis Nutt.

2. M. monophylla Sw. [16])
»diphylla». [17])

c. Sturmia Rchnb. [18])

3. M. Loeselii Sw. [19])

12. Listera R. Br. [20])

1. L. cordata R. Br.
2. L. ovata R. Br.

13. Neottia Linn.

1. N. Nidus avis Rich.

14. Epipogium Gmel.

1. E. aphyllum Sw.

15. Calypso Salisb. et Hook.

1. C. borealis S. et H.

16. Cypripedium Linn.

1. C. Calceolus Linn.
»biflorum».

ORD. 91. AROIDEÆ JUSS.

1. Arum Linn.

1. A. maculatum Linn.

2. Calla Linn.

1. C. palustris Linn.

3. Acorus Linn.

1. A. Calamus Linn.

ORD. 92. LEMNACEÆ DUB.

1. Lemna Linn.

a. Spirodela Schleid.

1. L. polyrhiza Linn. [21])

b. Telmatophace Schleid.

2. L. gibba Linn. [22])

c. Eulemna.

3. L. minor Linn.
4. L. trisulca Linn.

ORD. 93. TYPHACEÆ JUSS.

1. Typha Linn.

1. T. latifolia Linn.
2. T. angustifolia Linn.

2. Sparganium Linn.

1. S. ramosum Huds.
2. S. Friesii Beurl. [23])
3. S. simplex Huds.
4. S. affine Schnitzl. [24])
5. S. glomeratum Læst. [25])
(5.) S. fluitans Fr. [26])
6. S. oligocarpum [27]) Ångstr. [28])
7. S. minimum Fr. [29])

---

myodes Linn. O. myodes Jacq. — [15]) (*Ait.*) — [16]) Microstylis Lindl. — [17]) Ophrys latifolia Linn. svec. O. liliifolia Gunn. — [18]) Liparis Rich. (non *Arted.:* genus piscium.) — [19]) Sturmia Rchnb. — [20]) (*Ait.*) — [21]) Spirodela Schleid. — [22]) Telmatophace Schleid. — [23]) Bot. not. 1854, pag. 136. Th. M. Fr. ibidem, Jun. 1852, tab. I. fig. A. Sparg. natans Linn. lapp quout nostrum ab ipso olim puero ad ripam lacus *Moeklen* Smoland. visum voluerit intellectum. S. longifolium Turcz. ex Fr.; in Linn. herbar. obvium *sine* nomine specifico ex C. Hartm. in act. holm. 1851 pag. 313. — [24]) Th. M. Fr. l. c., tab. I. fig. B. Sparg. natans Linn. lapp. quoad locum! — [25]) (*Beurl. in öfvers. af vet. akad. förhandl. 9. årg. pag. 192.* — [26]) Nomen a forma normali *erecta* repudiatum! — [27]) Pro: »oligocarpon» (obsolete). — [28]) Var. ut subsequens. — [29]) Sparg. natans Linn. herbar.

»natans». [30]
8. S. hyperboreum Læst. [31]

ORD. 94. ZOSTERACEÆ KUNTH.

I. Zostera Linn.

1. Z. marina Linn.
(1.) Z. angustifolia Rchnb.
2. Z. minor Nolt. [32]

ORD. 95. POTAMEÆ JUSS.

I. Potamogeton Linn. [33]

α. Plantaginifolii:

1. P. natans Linn.
»subacaulis». [34]
2. P. fluitans Roth.
3. P. sparganifolius Læst. [35]
4. P. polygonifolius Pourr.
5. P. coloratus Vahl. [36]
(6.) P. alpinus Balb. [37]
6. P. rufescens Schrad.
»rivularis». [38]
»longifolius». [39]
7. P. salicifolius Wolfg. [40]
8. P. heterophyllus Schreb. [41]
(9.) P. curvifolius Hn.
9. P. nitens Web. [42]
10. P. decipiens Nolt. [43]
11. P. lucens Linn.
(11.) P. Zizii Mert. et Koch. [44]
12. P. prælongus Wulf.
(13.) P. Loeselii Roem. et Schult. [45]
13. P. perfoliatus Linn.
»ovato-lanceolatus». [46]
14. P. crispus Linn.

β. Zosteræfolii:

15. P. zosteræfolius Schum. [47]
16. P. acutifolius Link.
17. P. obtusifolius Mert. et Koch.
»ambiguus». [48]
18. P. mucronatus Schrad. [49]
19. P. pusillus Linn.
(19.) P. gracilis Fr. [50]
20. P. rutilus Wolfg.
(21.) P. zosteraceus Fr. [51]
21. P. pectinatus Auct. [52]
»scoparius». [53]
22. P. marinus All. [54]
(22.) P. fasciculatus Wolfg. [55]

---

ex C. Hartm. in act. holm. 1851 pag. 312 (de qua re in Hartm. scand. ed. VII. rite siletur), Sm. et omn. Auct. — 30) In *Nacka damm-sjö* Holmiæ, *Rättaredammen* prope *Drottningholm* etc. quotannis florens et fructificans, Sparg. *minimi* nomen merito recusans. — 31) (*Beurl. l. c.*); var. ut præcedens. — 32) (*Rchnb.*) — 33) Vide Beurl. in bot. not. 1853 pag. 88—90. — 34) In loc. exsiccatis. — 35) (*Fr.*); fol. natantia sæpe desunt. — 36) Potam. plantagineus Ducr. — 37) Potam. rufescens minor Hartm. — 38) (Sond.) — 39) (Læst. in sched.); in torrentibus? — 40) Fol. natantia *nunc* adsunt (*α.* Hartm.), *nunc* desunt (Potam. lanceolatus Rchnb. icon. fig. 55.) — 41) Fol. natantia *nunc* adsunt (huc: Fr. herbar. norm. IX. 73 primitiv. »Potam. coloratus Horn. var. forte», nec non innovat. »P. nigrescens Fr.»), *nunc* desunt (»P. gramineus L.! certe clareque!» *Fr.*); in Linn. herbar. desideratur! — 42) Optim. in »*Holma-ân* parocc. *Wingåker* Suderm.»: *Indebetou.* — 43) (*Koch.*) — 44) In lacu *Mæleri*, ex. gr. circa insulam *Fläsklösan* Holmiæ. — 45) In loc. exsiccatis; »rotundifolius». — 46) (Rchnb.); in fluviis. — 47) (»Potam. compressus L.! certiss». *Fr.*) — 48) (Beurl. in herbar. propr.) Fr. herbar. norm. V. 81 »Potam. pusillus major». (P. obtusifolius *lacustris!* Fr. summ.) — 49) Potam. Oederi G. F. W. Mey. P. pusillus major Auct. — 50) Potam. pusillus tenuissimus Auct. — 51) Potam. marinus Wg. — 52) Potam. marinus Linn. herbar., ubi nullum adest specimen »P. pectinatus» inscriptum. — 53) (Wallr.), Rchnb. icon. fig. 30 *β.* — 54) Potam. setaceus Schum. P. filiformis Pers. — 55) Rchnb. icon. fig. 28, 29; pedunculi abbreviati, fasciculos foliorum *haud* exce-

2. Ruppia Linn.

1. R. spiralis Linn. [56])
2. R. marina Linn. [57])
3. R. brachypus Gay.

3. Zannichellia Linn.

(1.) Z. major Boenningh.
1. Z. pedunculata Rchnb. [58])
2. Z. polycarpa Nolt.
»repens».

ORD. 96. NAJADEÆ LINK.

1. Najas Linn.

a. **Eunajas.**

1. N. marina Linn.

b. **Caulinia Willd.**

2. N. flexilis Rostk. et Schmidt. [59])

ORD. 97. HYDROCHARIDEÆ DC.

1. Stratiotes Linn.

1. S. aloides Linn.

2. Hydrocharis Linn.

1. H. Morsus ranæ Linn.

ORD. 98. ALISMACEÆ JUSS.

A. *BUTOMEÆ Rich.*

1. Butomus Linn.

1. B. umbellatus Linn. [60])

B. *ALISMEÆ Rich.*

2. Alisma Linn.

1. A. Plantago Linn.
»graminifolium». [61])
2. A. ranunculoides Linn.
»zosteræfolium».

3. Sagittaria Linn.

1. S. sagittifolia Linn.

C. *JUNCAGINEÆ Rich.*

4. Triglochin Linn.

1. T. palustre Linn.
2. T. maritimum Linn.

5. Scheuchzeria Linn.

1. S. palustris Linn.

ORD. 99. MELANTHACEÆ R. BR.

1. Narthecium Huds.

1. N. ossifragum Huds.

2. Tofieldia Huds.

1. T. calyculata Wg.
2. T. borealis Wg.

3. Veratrum Linn.

1. V. (album Linn.)
(1.) V. Lobelianum Bernh.

4. Colchicum Linn.

†1. C. autumnale Linn.

ORD. 100. IRIDEÆ JUSS.

1. Crocus Linn.

†1. C. vernus All.

2. Iris Linn.

α. Imberbes:

1. I. Pseudacorus Linn.
2. I. sibirica Linn.

β. Barbatæ:

†3. I. germanica Linn. [62])

---

dentes; ad insulam *Sand-ön* extra Holmiam. — [56]) (*Herbar.*) — [57]) (*Herbar.*) Rupp. rostellata Koch. — [58]) (*Excurs.*) Zann. palustris pedicellata Wg. Z. pedicellata Fr. — [59]) Caulinia Willd. — [60]) Usque ad *Kengis*, ubi minor, fol. angustissimis, »sterilis» *Læst. in sched.* — [61]) (Wg.) — [62]) Sv. bot. tab. 360. —

ORD. 101. AMARYLLIDEÆ R. BR.

1. Galanthus Linn.

†1. G. nivalis Linn.

2. Leucojum Linn.

†1. L. vernum Linn. [63])

3. Narcissus Linn.

a. **Eunarcissus.**

†1. N. poeticus Linn.

b. **Pseudonarcissus.**

†2. N. Pseudonarcissus Linn.

ORD. 102. LILIACEÆ DC.

LILIEÆ:

1. Tulipa Linn.

†1. T. sylvestris Linn.

2. Fritillaria Linn.

1. F. Meleagris Linn.

3. Lilium Linn.

†1. L. bulbiferum Linn.
†2. L. Martagon Linn.

ASPHODELEÆ:

4. Muscari Mill.

†1. M. botryoides Mill. [64])

5. Scilla Linn.

†1. S. italica Linn.
†2. S. verna Huds.

6. Allium Linn.

α. Schoenoprasa:

1. A. Schoenoprasum Linn.
(1.) A. sibiricum Linn. [65])
†2. A. fistulosum Linn.

β. Scorodoprasa:

3. A. Scorodoprasum Linn.
(3.) A. arenarium Linn. [66])
4. A. vineale Linn. [67])

γ. Conodoprasa:

5. A. oleraceum Linn.
6. A. carinatum Linn.

δ. Molia:

7. A. angulosum Linn. [68])
8. A. ursinum Linn.

7. Gagea Salisb.

1. G. stenopetala Rchnb.
2. G. lutea Schult.
3. G. spathacea Schult.
4. G. minima Schult.

8. Ornithogalum Linn.

a. **Euornithogalum.**

†1. O. umbellatum Linn.

b. **Myogalum Link.**

†2. O. nutans Linn. [69])

9. Anthericum Linn.

1. A. Liliago Linn. [70])
2. A. ramosum Linn. [71])

ORD. 103. ASPARAGEÆ JUSS.

1. Majanthemum Wigg.

1. M. bifolium DC. [72])

2. Smilacina Desf.

†1. S. stellata Desf. [73])

---

[63]) *Erinosma* Kunth. — [64]) *Botryanthus* vulgaris Kunth. — [65]) All. Schoenoprasum alpinum Gaud. et Auct. — [66]) (*Herbar.*), Sm. et Auct. All. Scorodoprasum minus Hartm. — [67]) All. arenarium Fr. — [68]) (*Herbar.*), Jacq. All. montanum Schmidt. A. fallax Don. — [69]) Myogalum Link. — [70]) *Phalangium* Schreb. — [71]) *Phalangium* Lam. — [72]) Majanth. Convallaria Wigg.! — [73]) *Asteranthemum* vulgare

3. Convallaria Linn.

1. C. majalis Linn.

4. Polygonatum All.

α. Alternifolia:

1. P. officinale All. [74]
2. P. multiflorum All.

β. Verticillata:

3. P. verticillatum All.

5. Paris Linn.

1. P. quadrifolia Linn. [75]

6. Asparagus Linn.

†1. A. officinalis Linn. [76]
»maritimus». [77]

ORD. 104. JUNCACEÆ BARTL.

1. Juncus Linn.

α. Acuti:

1. J. maritimus Lam.

β. Lateriflori:

2. J. conglomeratus Linn. [78]
»effusus». [79]
3. J. effusus Linn. [80]
»compactus». [79]
(3.) J. subuliflorus Drej.
4. J. diffusus Hopp.
5. J. glaucus Ehrh.
6. J. balticus Deth. [81]
7. J. arcticus Willd.
8. J. filiformis Linn.
»foliatus».

γ. Articulati: [82]

9. J. obtusiflorus Ehrh.
10. J. sylvaticus Reich.
11. J. lampocarpus Ehrh.
»fluitans».
(12.) J. atricapillus Drej. [83]
(12.) J. rariflorus Hn. [84]
12. J. alpinus Vill. [85]
»uniceps». [86]
13. J. supinus Moench.
(13.) J. uliginosus Roth. [87]
(13.) J. fluitans Lam. [88]

δ. Squarrosi:

14. J. squarrosus Linn.
15. J. bulbosus Linn. [89]
(15.) J. Gerardi Lois. [90]
16. J. bufonius Linn. [91]
17. J. pygmæus Thuill.
18. J. capitatus Weig.

ε. Stygii:

19. J. trifidus Linn.
20. J. castaneus Sm.
21. J. stygius Linn.
22. J. triglumis Linn.
23. J. biglumis Linn.

2. Luzula DC.

1. L. maxima DC.
2. L. vernalis DC. [92]
3. L. multiflora Lej.
(3.) L. congesta Lej.
(3.) L. nigricans Desv.
4. L. pallescens Sw.
5 L. campestris DC.
(5.) L. nivalis Læst. [93]

Kunth. — 74) Polygonat. anceps Moench. P. vulgare Desf. — 75) Var. fol. 5-nis. — 76) (*Svec.*), Auct. Aspar. sativus Mill. — 77) (Kunth.) — 78) Junc. communis α. E. Mey. — 79) (Hopp.) — 80) Junc. communis β. E. Mey. — 81) (*Willd.*) — 82) Junc. *articulatus* Linn.! — 83) Junc. nigricans Drej. in Rchnb. icon. J. atratus Fr., non *Krock.*; vix differt J. fusco-ater Schreb.: forma *turfosa* J. alpini Vill. — 84) Anthel. major, lætius tincta; forma *litoralis*. — 85) Junc. ustulatus Hopp.; huc: J. nodulosus Wg., nec non J. alpestris Hartm. — 86) (Læst.) — 87) Junc. supinus repens Koch. — 88) Junc. supinus fluitans Koch. — 89) Junc. compressus Jacq. (nom. aptius!) — 90) Junc. bottnicus Wg. — 91) Var. florib. subfasciculatis. — 92) Luz. pilosa Willd. — 93) (*Spreng.*) Luz. hyperborea Fr.,

6. L. spicata DC.
(6.) L. conglomerata Mielichh.
7. L. arcuata Sw. [94]
»subspadicea». [95]
8. L. Wahlenbergii Rupr. [96]
9. L. parviflora Desv.
(9.) L. melanocarpa Desv.

ORD. 105. CYPERACEÆ JUSS.

1. Cyperus Linn.

1. C. fuscus Linn.

2. Schoenus Linn.

1. S. ferrugineus Linn. [97]
2. S. nigricans Linn. [98]

3. Cladium P. Br.

1. C. Mariscus R. Br. [99]

4. Rhynchospora Vahl.

1. R. fusca Roem. et Schult.
2. R. alba Vahl.

5. Scirpus Linn.

a. Nemocharis Beurl. [100]

1. S. sylvaticus Linn. [1]

b. Euscirpus.

α. Phyllantheli:

2. S. maritimus Linn.
(2.) S. macrostachys Willd. [2]

β. Cladantheli:

3. S. lacustris Linn.
(3.) S. Tabernæmontani C. C. Gmel.

6. Isolepis R. Br.

1. I. setacea R. Br.

7. Eleocharis R. Br. [3]

a. Eueleocharis. [4]

1. E. palustris R. Br.
2. E. uniglumis Schult.

b. Limnochloa PB. [5]

3. E. multicaulis Lindl. [6]
4. E. pauciflora Link. [7]
5. E. acicularis R. Br. [6]
6. E. parvula Beurl. [8]

c. Eleogiton Link. [9]

7. E. fluitans. [10]

8. Trichophorum Pers.

1. T. cæspitosum Hn.
2. T. alpinum Pers.

9. Eriophorum Linn.

α. Monostachya:

1. E. Scheuchzeri Hopp.
(1.) E. medium Anderss. [11]
(1.) E. rufescens Anderss. [12]
(2.) E. russeolum Fr. [13]

---

non *R. Br.* — [94]) Anthelul. utplurimum tres, nempe duæ rameales et tertia intermedia, capituliformes, densifloræ. — [95]) Gracilior, anthel. composita, sublaxiflora; in alpib. Scand. australioribus, ex. gr. *Jemtlandicis,* ubi forma normalis desideratur vel saltem nimis rarescit. In herbariis nonnumq. cum subsequente confusa. — [96]) In Europ. *australiore* desideratur. — [97]) *Streblidia* ferruginea Link. — [98]) *Streblidia* Beurl. in bot. not. 1853 pag. 52. — [99]) Clad. germanicum Schrad.! — [100]) (*L. c.*) — [1]) Nemocharis sylvatica Beurl. l. c. pag. 53. — [2]) Legi extra *Strömstad* Bahus. — [3]) A nonnull. scribitur: *Heleocharis.* — [4]) Stigm. 2. — [5]) Stigm. 3. — [6]) Limnochloa Rchnb. — [7]) Limnochloa Bæothryon Rchnb. — [8]) (*L. c.*) — [9]) A nonnull. scribitur: *Heleogiton;* stigm. 2. — [10]) Eleogiton Link. — [11]) (*Bot. not. 1857.*) — [12]) (*L. c.*) — [13]) (*Hartm. scand. ed. III.*) Erioph. vaginatum medium Læst. loc. parall. E. Chamissonis C. A. Mey. (*Fr. mant. II., Ledeb. ross.!*) »E. Chamissonis C. A. Mey. est omnino E. capitatum Svecorum»

(2.) E. callitrix Cham. [14])
2. E. vaginatum Linn.

β. Polystachya:

3. E. gracile Koch. [15])
4. E. latifolium Hopp.
5. E. angustifolium Roth.
»elatius». [16])
»minus». [17])

10. Kobresia Willd.

a. Elyna Schrad.

1. K. scirpina Willd. [18])

b. Eukobresia.

2. K. caricina Willd.

11. Blysmus Panz. [19])

1. B. rufus Link.
2. B. compressus Panz. [20])

12. Carex Linn.

α. Monostachyæ:

* Distigmaticæ: [21])

1. C. dioica Linn.
»androgyna». [22])
(1.) C. parallela Sommerf. [23])
2. C. nardina Hornem. [24])
3. C. capitata Linn.
4. C. psyllophora Ehrh. [25])

** Tristigmaticæ:

5. C. Wormskjoeldiana Hornem. [26])
6. C. pauciflora Lightf. [25])
7. C. microglochin Wg.
8. C. rupestris All.
9. C. obtusata Liljebl.

β. Homostachyæ:

(Distigmaticæ.)

(10.) C. Deinboelliana Gay. [27])
10. C. incurva Lightf.
»erecta».
11. C. chordorhiza Ehrh.
12. C. brevirostris Cederstr.
13. C. disticha Huds.
14. C. arenaria Linn.
15. C. Schreberi Schrank.
16. C. ovalis Good. [28])
(16.) C. argyroglochin Hornem.
17. C. festiva Dew.
18. C. lagopina Wg. [28])
19. C. glareosa Wg.
20. C. heleonastes Ehrh.
21. C. norvegica Willd.
22. C. helvola Blytt. [29])
23. C. microstachya Ehrh.
24. C. multiculmis Ehrh. [30])
25. C. Boenninghauseniana Weih.
26. C. remota Linn.
27. C. curta Good. [30])
»pseudo-norvegica». [31])
(27.) C. lapponica O. F. Lang. [32])
28. C. Persoonii Sieb. [33])
(29.) C. macilenta Fr.
29. C. tenuiflora Wg.

Fr. summ. pag. 221. — [14]) (Sec. Anderss. l. c.; specim. *authent.* non vidi.) Erioph. vaginatum opacum Björnstr. pitens.; ex *Edefors* Bottn. boreal.-occidentalis a *M. G. Brandelio* nuperrime reportatum. — [15]) (*Roth.*) Erioph. triquetrum Hopp.! — [16]) (Koch.) Erioph. angustifolium longifolium Hopp.!; Lappon.: *Læst.!* — [17]) (Koch.) Erioph. angustifolium alpinum Gaud. (triquetrum Hartm.); Lappon.: *Læst.! Nb.* Occurrit raro: *monostachyum,* quale e *Karesuando* Lappon. tornensis misit *Læst.* — [18]) Elyna spicata Schrad. — [19]) (*Link.*) — [20]) (*Link.*) Car. uliginosa Linn. svec.; in ej. herbar. non reperiendus! — [21]) Plerumq.! — [22]) *Holmiæ* legi. — [23]) Huc: Car. dioica paralleloides Lund. *Nb.* C. gynocrates Wormskj. est civis *nimis dubia.* — [24]) (*Fl. dan. tab. 2365*); »jam 1819 a me Car. nardina dicta, indeque orta: C. nardina Hornem.» *Fr.!* — [25]) Car. pulicaris Linn. pr. p:te. — [26]) Car. scirpoides Michx.?; e *Solvaagtind* in *Saltdalen* Nordlandiæ norvegicæ hoc anno denuo reportata. — [27]) Car. arctica Deinb. msscrpt., non *Dew.* — [28]) Car. leporina Linn. pr. p:te. — [29]) (*Fr.*) — [30]) Car. brizoides Linn. herbar.! — [31]) Fr. herbar. norm. VII. 83, XI. 80. — [32]) Car. canescens subloliacea Læst. — [33]) (*Rchnb.*) Car.

30. C. loliacea Linn.
31. C. gracilis Ehrh. [34])
32. C. echinata Murr. [35])
(32.) C. grypus Schkuhr.
33. C. muricata Murr. [36])
(33.) C. virens Lam.
34. C. divulsa Good.
(35.) C. nemorosa Willd.
35. C. vulpina Linn.
36. C. teretiuscula Good.
(36.) C. Ehrhartiana Hopp. [37])
37. C. paradoxa Willd.
38. C. paniculata Linn.

γ. Heterostachyæ:

* Distigmaticæ:

39. C. maritima Müll. [38])
40. C. Lyngbyi Hornem.
41. C. cryptocarpa C. A. Mey.
42. C. halophila Nyl.
43. C. hæmatolepis Drej. [39])
44. C. salinoides Beurl. [40])
45. C. salina Wg. [41])
»mutica».
46. C. subspathaceaWormskj. [42])
(47.) C. juncella Fr.
47. C. Goodenowii Gay. [43])
48. C. pacifica Drej. [44])
(48.) C. turfosa Fr.
(48.) C. bolina O. F. Lang.
49. C. stricta Good.
(50.) C. vacillans Drej. [45])
50. C. acuta Linn. [46])
»rufa». [47])
»viridis». [48])
(50.) C. tricostata Fr. [49])
(51.) C. limula Fr. [50])
51. C. hyperborea Drej. [51])
52. C. aquatilis Wg.
53. C. borealis O. F. Lang. [52])
54. C. elytroides Fr. [53])
55. C. rigida Good. [54])
»androgyna». [55])
»inferalpina».
»glacialis».
56. C. bicolor All.
57. C. rufina Drej.

** Tristigmaticæ:

58. C. Buxbaumii Wg. [56])
»submutica».
»heterostachya».
»cylindrostachya».
59. C. alpina Sw. [57])
»inferalpina».

Gebhardi Hopp.! C. canescens alpicola Wg. C. vitilis Fr. — [34]) Car. tenella Schkuhr. C. disperma Dew. — [35]) Car. muricata Linn. pr. p:te. C. stellulata Good. — [36]) Linn. pr. p:te. — [37]) Car. teretiuscula major Koch. — [38]) An omnes infra admissæ *Carices salinæ* re vera sint species definitæ, nec ne, dijudicare non audeo. — [39]) *Auct.; bahusiensis.* — [40]) (*Bot. not. 1853, pag. 35.*) Fr. herbar. norm. VIII. 72; *Christianiæ* Norveg. austr. — [41]) Ad litora maris *arctici; »cuspidata».* — [42]) Stigm. 2—3. *Nb.* Ex mente *Kochii* ad Car. vaginatam Tausch pertinet C. subspathacea Wormskj. fl. dan. tab. 1530. — [43]) Car. cæspitosa Linn. herbar.!, Good. »et Auct. omn. usque ad nostra tempora» *Koch.* C. vulgaris Fr. — [44]) Car. Drejeri O. F. Lang, Koch etc. Car. cæspitosa Fr., non *Linn. herbar.,* nec *Good.* — [45]) »Car. acuta» (e *Salisburgo*): *Hopp. exsicc.!* C. aquatilis β. Beurl. in act. holm. 1843 pag. 295 (e litore lacus *Kalln* infra *Åreskutan* Jemtl.) — [46]) (*Herbar.*) Car. prolixa Fr. — [47]) (Linn.) Car. acuta Fr. — [48]) (Hartm.) — [49]) »Car. fluviatilis» *Indebetou in sched., 1821.* — [50]) Car. acuta ripensis Læst. in sched., subsequente incl. — [51]) Car. arctophila Nyl. — [52]) Car. aquatilis epigejos Læst. (*non* C. epigejos Fr.: C. discolor Nyl. *fenn.*). — [53]) Car. flacca Zetterst. it.?; »flaccæformis» *Læst.* (»C. acuta terrestris» *id. in sched.*) — [54]) Car. saxatilis Wg. et Auct. plur. — [55]) In subsylvaticis alpis *Åreskutan* Jemtl. frequens. — [56]) Car. canescens Linn. herbar., habitans »in *Lapponia, Uplandia» ej. svec.!* — [57]) (*Liljebl.*) Car. pilulifera Linn. herbar., ubi stirps *homonyma Auct.* desideratur!

60. C. atrata Auct. [58]
»spadicea». [59]
»pseudo-nigra». [60]
61. C. ustulata Wg. [61]
62. C. (fuliginosa Schkuhr.)
(62.) C. misandra R. Br.
63. C. irrigua Sm. [62]
64. C. limosa Linn.
»pallescens». [63]
»agynostachys». [64]
65. C. laxa Wg.
(66.) C. stygia Fr.
66. C. rariflora Sm.
67. C. livida Wg.
(67.) C. pelia O. F. Lang. [65]
68. C. panicea Linn.
69. C. vaginata Tausch.
70. C. capillaris Linn.
71. C. sylvatica Huds. [66]
72. C. pediformis C. A. Mey.
73. C. digitata Linn.
74. C. ornithopoda Willd.
75. C. pedata Wg.
76. C. globularis Linn.
77. C. tomentosa Linn.
78. C. pilulifera Auct. [67]
79. C. montana Linn. [68]
80. C. ericetorum Poll.
81. C. præcox Jacq.
»refracta».
82. C. glauca Scop.
83. C. pallescens Linn.
(83.) C. undulata Kunz.
84. C. flava Linn. [69]
»acrogyna».
»pygmæa».
(84.) C. lepidocarpa Tausch.
(84.) C. Oederi Ehrh.
»pygmæa».
85. C. extensa Good.
86. C. fulva Good.
87. C. Hornschuchiana Hopp.
88. C. binervis Sm.
89. C. punctata Gaud.
90. C. distans Linn.
(91.) C. hirtæformis Pers. [70]
91. C. hirta Linn.
92. C. filiformis Linn.
93. C. evoluta Hn.
94. C. riparia Curt.
»androgyna». [71]
95. C. paludosa Good.
96. C. vesicaria Linn.
(97.) C. stenolepis Less. [72]
97. C. saxatilis Linn. [73]
(97.) C. pulla Good. [74]
98. C. rotundata Wg.
»inferalpina». [75]
99. C. ampullacea Good.
100. C. rhynchophysa C. A. Mey.
101. C. Pseudocyperus Linn.
»acrogyna».

ORD. 106. GRAMINEÆ JUSS.

ORYZEÆ:

1. Coleanthus Seid. [76]

1. C. subtilis Seid. [77]

— 58) Vide sub Car. ustulata. — 59) Stirps elegans, spic. *spadiceis*, a me in *Totthummeln* alpis *Åreskutan* 1843 lecta. — 60) Car. nigra Fr., minime *All.*; legi in alpe *Åreskutan*. — 61) Car. atrata Linn. herbar., ubi *homonyma Auct.* desideratur. — 62) (*Hopp.*) — 63) (Anderss.); legi ad lacum *Åre* Jemtl. — 64) »Car. limosa * mas» *Læst. in sched.* — 65) Car. panicea sublivida Hartm. — 66) Car. Drymeja Ehrh. — 67) Car. decumbens Ehrh.!; vide sub C. alpina. — 68) (*Svec.*) Car. collina Willd. — 69) De Car. »flavo-fulva» vide Beurl. in bot. not 1853 pag. 37, not. 57. — 70) Car. hirta glabriuscula Auct. — 71) Car. nutans Fr. mant. 1. — 72) Fr. herbar. norm. VIII. 71 »Car. vesicaria var. alpigena»; spic. *fuscæ*. — 73) Fr. herbar. norm. XI. 76; spic. subtessulato-variegatæ, *dichroæ*. — 74) Fr. herbar. norm. III. 74; spic. *piceæ*. — 75) Car. ampullacea borealis Læst. — 76) (*Roem. et Schult.*) — 77) (*L. c.*) Schmidtia Tratt. S. utriculosa Sternb. in bot. ztng. —

PANICEÆ:

2. Echinochloa PB.

1. E. Crus galli PB.

3. Digitaria Scop.

†1. D. ciliaris Koel.
2. D. humifusa Pers.

4. Setaria PB.

†1. S. verticillata PB.
2. S. (viridis PB.) [78]
»minor». [79]

PHALARIDEÆ:

5. Phleum Linn.

a. Euphleum.

1. P. pratense Linn.
(1.) P. nodosum Linn.
2. P. alpinum Linn. [80]

b. Chilochloa PB.

3. P. Boehmeri Wib. [81]
4. P. arenarium Linn. [82]

6. Alopecurus Linn.

α. Perennes:

1. A. pratensis Linn.
(1.) A. ruthenicus Weinm.
2. A. geniculatus Linn.
(2.) A. fulvus Sm.

β. Annui:

3. A. agrestis Linn.

7. Phalaris Linn.

a. Euphalaris.

†1. P. canariensis Linn.

b. Digraphis Trin.

2. P. arundinacea Linn. [83]
† »picta».

AVENACEÆ:

8. Anthoxanthum Linn.

1. A. odoratum Linn.

9. Hierochloa Gmel.

1. H. borealis Roem. et Schult.
»grandiflora».
2. H. alpina Roem. et Schult.

10. Holcus Linn.

1. H. lanatus Linn.
»albo-virens».
2. H. mollis Linn.

11. Aira Linn.

a. Vahlodea Fr.

1. A. atropurpurea Wg. [84]

b. Deschampsia PB.

2. A. alpina Linn. [85]
»vivipara».
3. A. cæspitosa Linn. [86]
»ochroleuca». [87]
»montana». [88]
»glauca». [89]
4. A. bottnica Wg. [90]

c. Euaira Beurl.

(5.) A. montana Linn. [91]
5. A. flexuosa Linn.
(5.) A. discolor Thuill. [92]

d. Chamavena Beurl.

6. A. caryophyllea Linn.
7. A. præcox Linn.

---

78) Rchnb. icon. XI. fig. 1467. — 79) Rchnb. l. c. fig. 1467 b. — 80) Vide Beurl. in bot. not. 1856 pag. 65, not. 4. — 81) Chilochloa PB. — 82) Chilochloa arenaria PB. — 83) Digraphis Trin. — 84) Vahlodea Fr. — 85) Deschampsia Roem. et Schult. — 86) Deschampsia PB. — 87) Rchnb. icon. XI. fig. 1685. — 88) Rchnb. icon. XI. fig. 1683. — 89) (Hartm.) — 90) Deschampsia Trin. — 91) (*Svec.*, ut plurimi volunt, *non* ej. herbar.), Rchnb. icon. XI. fig. 1679. — 92) Air. uliginosa Weih.

12. Corynephorus PB.

1. C. canescens PB.

13. Koeleria Pers.

(1.) K. glauca DC.
1. K. cristata Pers. [93])

14. Avena Linn.

a. Trisetum Pers.

1. A. subspicata Clairv. [94])
2. A. subalpestris Hn. [95])
3. A. flavescens Linn. [96])

b. Avenaria.

4. A. pratensis Linn.
5. A. pubescens Linn.

c. Euavena.

6. A. fatua Linn.
(6.) A. intermedia Lindgr.
7. A. strigosa Schreb.

15. Arrhenatherum PB.

1. A. avenaceum PB.

16. Danthonia DC.

1. D. decumbens DC. [97])

STIPACEÆ:

17. Melica Linn.

α. Barbatæ:

1. M. ciliata Linn.

β. Melicastra:

2. M. nutans Linn.
3. M. uniflora Linn.

18. Milium Linn.

1. M. effusum Linn.
»purpurascens».

19. Stipa Linn.

1. S. pennata Linn.

AGROSTIDEÆ:

20. Agrostis Linn.

a. Anemagrostis Trin.

1. A. Spica venti Linn. [98])
»pygmæa». [99])
(1.) A. purpurea Gaud. [100])

b. Euagrostis.

α. Genuinæ:

(2.) A. gigantea Roth.
2. A. alba Linn. [1])
»prorepens». [2])
(2.) A. maritima Lam. [3])
(2.) A. decumbens Host. [4])
(3.) A. tenella Hoffm.
3. A. vulgaris With. [5])
»vivipara».
»aristata». [6])

β. Trichodia:

(4.) A. hybrida Rchnb. [7])
(4.) A. pallida Schkuhr.
4. A. canina Linn.
5. A. borealis Hn. [8])
»angustata». [9])

— [93]) *Airochloa* Link. — [94]) Trisetum subspicatum PB. — [95]) Trisetum agrostideum Fr. — [96]) Trisetum PB. — [97]) *Sieglingia* Bernh. — [98]) Anemagrostis Trin. — [99]) Fr. herbar. norm. XIV. 98. — [100]) Rchnb. icon. XI. fig. 1420. — [1]) (*Herbar.*), Schrad. — [2]) (Koch.) — [3]) Agr. straminea Hartm. — [4]) Habeo specim. *Læstadian.* e *Karesuando* Lappon. tornens.; *aristata.* — [5]) Agr. rubra Linn. herbar., habitans »ad ripas lacuum et in pratis depressis ubique» *Linn. svec.* (»in *Europæ* arenosis subhumidis» *ej. spec.*) — [6]) Agr. rubra *α* Wg. upsal.! — [7]) (*Icon. XI. fig. 1426!*); legi in siccis extra *Danviken* Holmiæ. — [8]) Agr. rubra Wg. lapp.!; in Linn. herbar. haud reperienda. — [9]) (Blytt.) Agr. rupestris Auct. svec., non *All.*; conferatur etiam: A. alpina Beurl. in bot. not. 1856 pag. 67. —

21. Cinna Linn.

1. C. pendula Trin. [10])

ARUNDINACEÆ:

22. Calamagrostis Roth.

a. Eucalamagrostis.

α. Deyeuxiæ:

1. C. acutiflora DC.
2. C. varia PB.
   »bovina». [11])
3. C. arundinacea Roth.
4. C. lapponica Hn.
   »opima». [12])
5. C. neglecta Fl. wett.
   »elatior».
   »geniculata».
6. C. strigosa Hn. [13])
7. C. Hartmanniana Fr. [14])

β. Genuinæ:

8. C. Halleriana DC.
   »gracilescens». [15])

(8.) C. pulchella Saut.

9. C. phragmitoides Hn.

(9.) C. elata Blytt.

10. C. lanceolata Roth.

(10.) C. Gaudiniana Rchnb. [16])

11. C. laxa Host. [17])
12. C. epigejos Roth.
    »gracilescens». [18])

(12.) C. glauca Rchnb.

b. Psamma PB.

13. C. arenaria Roth. [19])
14. C. baltica Hn. [20])

23. Phragmites Trin.

1. P. communis Trin.

FESTUCACEÆ:

24. Scolochloa Link.

1. S. festucacea Link.

25. Molinia Schrnk.

1. M. cærulea Moench.

26. Colpodium Trin.

1. C. latifolium R. Br. [21])

27. Catabrosa PB.

a. Phippsia R. Br.

1. C. algida Fr. [22])

b. Eucatabrosa Beurl.

2. C. aquatica PB.

28. Glyceria R. B.

a. Arctophila Rupr.

1. G. pendulina Læst. [23])

b. Hydrochloa Hn.

2. G. norvegica Sommerf.
3. G. aquatica Wahlb. [24])

c. Euglyceria Beurl.

4. G. fluitans R. Br. [25])
   »vulgata». [26])
   »loliacea». [27])
   »pumila». [28])

d. Atropis Griseb.

5. G. maritima Wahlb. [29])
   »virens». [30])

---

[10]) Mühlenbergia Hartm. — [11]) (Læst. in herbar. reg. acad. scient. holm.; »chalybea» olim in act. holm.) Calamagr. chalybæa Fr., *non* C. chalybea Blytt. — [12]) (Hartm.) Calamagr. chalybea Blytt. — [13]) Conf.: »Calamagr. epigejos riparia» *Læst. in sched.* — [14]) Calamagr. ambigua Hartm.! — [15]) (Blytt.) — [16]) Calamagr. lanceolata virescens Hartm. — [17]) Specim. *scand.* non vidi. — [18]) (Blytt.) — [19]) Psamma Roem. et Schult. — [20]) Psamma Roem. et Schult.; an a præcedente *specifice* differt? — [21]) *Arctagrostis* latifolia Griseb. — [22]) Phippsia R. Br. — [23]) Arctophila Læstadii Rupr. — [24]) Hydrochloa Hartm. — [25]) *α. mannifera.* Glycer. plicata Fr. — [26]) Festuca fluitans Linn. herbar. — [27]) (Hartm.) — [28]) (Wimm.) — [29]) Atropis Griseb.; panicul. in *flavidum* vergens. — [30]) Fr.

»purpurascens».
(5.) G. conferta Fr. [31]
6. G. distans Wg. [32]
»capillaris». [33]
»pulvinata». [34]

29. Poa Linn.

1. P. annua Linn.
(1.) P. supina Schrad.
(2.) P. humilis Ehrh.
2. P. pratensis Linn.
»rigens». [35]
»angustifolia». [36]
3. P. trivialis Linn. [37]
»lævis». [38]
»multiflora». [39]
4. P. (sudetica Hænk.)
»remota». [40]
5. P. serotina Ehrh. [41]
»fertilis». [42]
»palustris». [43]
(6.) P. palustris DC. [44]
6. P. nemoralis Linn.
»montana». [45]
(6.) P. glauca Vahl.
»glaucantha». [46]
7. P. cæsia Sm. [47]
8. P. (laxa Hænk.)
(8.) P. minor Gaud. [48]
»vivipara». [49]
9. P. arctica R. Br. [50]
10. P. cenisia Auct. [51]
11. P. alpina Linn.
»vivipara».
»nodosa». [52]
12. P. bulbosa Linn.
»vivipara».
13. P. compressa Linn.

30. Briza Linn.

1. B. media Linn.

31. Dactylis Linn.

1. D. glomerata Linn.
»glaucescens».

32. Sesleria Ard.

1. S. cærulea Ard.

33. Cynosurus Linn.

1. C. cristatus Linn.

34. Festuca Linn.

a. Vulpia Gmel.

1. F. bromoides Auct. [53]

b. Eufestuca Beurl.

(2.) F. tenuifolia Sibth.
(2.) F. capillata Lam.
2. F. ovina Linn.
»vivipara».

---

herbar. norm. V. 95 »festucæformis». — [31]) Vide Beurl. in bot. not. 1856 pag. 70, not. 5. — [32]) Atropis Griseb. — [33]) (Wahlb.) Rchnb. icon. XI. fig. 1610. — [34]) Fr. herbar. norm. V. 90. — [35]) (Hartm.) — [36]) (Sm.) — [37]) Poa scabra Ehrh. — [38]) Fr. herbar. norm. VII. 92. — [39]) Rchnb. icon. XI. fig. 1655. — [40]) Poa remota af Forsell, sec. Wg. et Hartm. — [41]) Fr. herbar. norm. VI. 83. — [42]) Rchnb. icon. XI. fig. 1647; in glareosis (ripis lacus *Mæleri*) eximie *stolonifera*. — [43]) Rchnb. l. c. fig. 1645. Poa palustris Roth ex nonnull. — [44]) Rchnb. icon. XI. fig. 1643. Poa nemoralis rigidula Koch. P. serotina firma Hartm.; legi prope *Strömstad* Bahus. — [45]) Rchnb. l. c. fig. 1641; ad rupes umbrosas, ex. gr. in *Djurgården* Holmiæ. — [46]) Rchnb. l. c. fig. 1644. — [47]) A Poa nemorali glaucantha vix nisi radice *fibrosa* (nec stolonifera) discrepans. — [48]) Poa laxa Auct. svec. — [49]) Poa stricta Lindeb. — [50]) Fr. herbar. norm. III. 94, VI. 84, VII. 93 »abbreviata». — [51]) DC., Koch etc. Poa flexuosa Wg. *carpath.* (*non* ej. svec.), Rchnb. icon. XI. fig. 1632, 1633; ex. gr. ad *Almanberg* par. *Opdal* Norveg. ex speciminib. *Blyttianis* luculentissimis. (In *Groenland.* ex speciminib. *Vahlianis.*) — [52]) (Hartm.); in *Alfvaren* Oeland. — [53]) Vulpia Link. Fest. sciuroides Roth.

(2.) F. glauca Lam. [54]
(3.) F. curvula Gaud. [55]
3. F. duriuscula Auct. [56]
»maritima». [57]
4. F. rubra Linn.
»submutica».
»villosa». [58]
»litoralis». [59]
(4.) F. arenaria Osb.

c. Phæochloa Griseb.

5. F. sylvatica Vill.

d. Schoenodorus PB. [60]

6. F. pratensis Huds. [61]
»loliacea». [62]
7. F. arundinacea Schreb. [63]

35. Bromus Linn.

a. Bubromus Beurl.

1. B. giganteus Linn.
2. B. asper Linn.
3. B. erectus Huds.
4. B. inermis Leyss.
»breviaristatus». [64]

b. Eubromus Beurl. [65]

5. B. sterilis Linn.
6. B. tectorum Linn.
»leiostachys».

c. Zeobromus Griseb. [66]

(7.) B. patulus Mert. et Koch.
7. B. arvensis Linn.
8. B. secalinus Linn.
»longearistatus». [67]
»submuticus».
(9.) B. commutatus Schrad. [68]
»simplex». [69]
9. B. racemosus Linn. [70]
10. B. mollis Linn.
»nanus». [71]
»monostachys».
»leiostachys».
(10.) B. hordaceus Wg.

36. Brachypodium PB.

(1.) B. rupestre Roem. et Schult. [72]
1. B. pinnatum PB.
2. B. gracile PB.

TRITICEÆ:

37. Lolium Linn.

a. Eulolium Beurl.

1. L. festucaceum Link.
2. L. perenne Linn.
»tenue». [73]

b. Temulentum Beurl.

3. L. linicola Sond. [74]
(4.) L. arvense With. [75]
4. L. temulentum Auct. [76]

38. Triticum Linn.

1. T. caninum Linn. [77]
»violascens».
2. T. violaceum Hornem. [78]

— [54]) Fr. herbar. norm. V. 96. Fest. ovina vaginata Hartm.; in *Alfvaren* Oeland. — [55]) Fr. herbar. norm. V. 98 »cæsia»; in *Alfvaren* Oeland. — [56]) Fr. l. c. VIII. 94. — [57]) (Beurl. in bot. not. 1856 pag. 72. not. 1.) — [58]) (Koch.) — [59]) (G. F. W. Mey.); ad *litora* maris baltici occidentalis *scopulosa*. — [60]) A: *σχοινοσ* et *δωρον*. — [61]) Schoenodorus PB. — [62]) Rchnb. icon. XI. fig. 1566. — [63]) Fest. elatior Linn. herbar. Schoenodorus PB. — [64]) Fr. herbar. norm. VII. 94. — [65]) »Bromi genuini» *Koch*. — [66]) Serrafalcus Parl. — [67]) Arist. paleam subæquantibus. — [68]) Fr. herbar. norm. VI. 89 »pratensis». — [69]) Fr. l. c. VII. 95 »simplex». — [70]) Fr. l. c. I. 79 »pratensis». — [71]) Bromus Weig. — [72]) Spicul. *glaberrimæ*. — [73]) Rchnb. icon. XI. fig. 1346 dextr. — [74]) Fr. herbar. norm. II. 78 »arvense». Lol. temulentum Linn. herbar., habitans »inter...... *Linum*» *ej. svec. et spec.* — [75]) Rchnb. icon. XI. fig. 1343. — [76]) Sv. bot. tab. 192; vide sub Lol. linicola. — [77]) *Agropyrum* Roem. et Schult. — [78]) *Agropyrum*

3. T. repens Linn. [79])
(3.) T. maritimum Koch et Ziz.[80])
4. T. affine Deth. [81])
5. T. acutum Auct. [82])
6. T. junceum Linn. [83])

39. Elymus Linn.

a. Euelymus Beurl.

1. E. arenarius Linn. [84])

b. Medusather Griseb.

2. E. europæus Linn.

40. Hordeum Linn. [85])

1. H. pratense Linn. [86])
2. H. murinum Linn.
† 3. H. maritimum With.

ROTTBOELLIACEÆ:

41. Rottboellia Linn. fil.

1. R. filiformis Roth. [87])
»incurva». [88])

42. Nardus Linn. [89])

1. N. stricta Linn.

Beurl. in bot. not. 1856 pag. 73. — [79]) *Agropyrum* PB., Rchnb. icon. XI. fig. 1383—1388; magnopere varians (formis notabilioribus in icon. cit. egregie illustratis), nempe: *arvense, dumetorum, Vaillantianum, Leersianum* etc. — [80]) Fr. herbar. norm. VI. 96 (primitiv.) »litorale» (innovat. exhibet specim. cult.? Tritici litoralis Host in *Scand.* non obvii.) — [81]) *Agropyrum* Rchnb. icon. XI. fig. 1391. Fr. herbar. norm. VI. 94 »laxum»; var. rachi dorso villosula: Fr. l. c. II. 80 »repens var.» — [82]) DC.? (de ratione dubii vide Anderss. gram. pag. 3, obs. 1; item Beurl. in bot. not. 1855 pag. 102, not. 9.) *Agropyrum* Roem. et Schult.; var. rachi dorso villosula: Fr. herbar. norm. II. 79 »strictum», VI. 93. — [83]) *Agropyrum* PB.; cum ceteris *Agropyris* spicularum magnitudine varians. — [84]) Spic. geniculato-inflexa (»ob ustilaginem corrumpentem» *Wg.*): Elym. geniculatus Curt. — [85]) *Nostra* e sect.: *Myocriton.* — [86]) (*It. scan. pag. 214.*) — [87]) *Lepturus* Trin., Fr. herbar. norm. XI. 94. — [88]) Anderss. gram. tab. I. fig. 12. 2. Rottb. incurvata Nolt. holsat., non *Linn. fil.* — [89]) Genus, mediante *Psiluro, Rottboelliaceis* subjunctum.

Menda typographica:

Pag. 9, sub **Silene:** (6.) S. anglica Linn.; *lege:* (6.) S. anglica Linn.
» 15, sub **Ervo:** a. **Enervum.**; *lege:* a. **Euervum.**
» 19, sub **Circæa:** 3. C. luteliana Linn.; *lege:* 3. C. lutetiana Linn.
» 26, not. 59: *Dimorphantes* Cass.; *lege: Dimorphanthes* Cass.

Index
Generum eorumque Sectionum.

Numeri paginas libri indicant.

Corrigenda:

Pag. 52, sub **Ruppia,** *pro:* 2. R. marina Linn. *lege:* 2. R. maritima Linn.
» 53, sub **Allio,** *pro:* γ. Conodoprasa: *lege:* γ. Codonoprasa:

